王雲五主編

景印岫廬現藏罕傳善本叢刊

明繆希雍撰 神農本草經疏 四

臺灣商務印書館發行

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
MEDICAL CENTER LIBRARY
SAN FRANCISCO



ORIENTAL
COLLECTION

Miao, Hsi-yung, d. 1627

明繆希雍撰

神農本草經疏 四

臺灣商務印書館發行

OC-8103

神農本草經疏卷之十二

木部上品

總七十二種今疏其要者二十九種

桂　松脂實葉節附　槐實枝皮根附

槐花附槐實條　枸杞　栢實葉白皮附

茯苓茯神附　琥珀　酸棗仁

蘗木　楮實　乾漆葉附

五加皮　牡荊實　蔓荊實

RS180
C5
S4935
V.4
1973
O.C.

OC - 8103

導百藥無所畏久服神仙不老元素補下焦不足治沉寒痼冷之病滲泄止渴去榮衛中風寒表虛自汗春夏爲禁藥秋冬下部腹痛非此不能止 好古補命門不足益火消陰 日華子桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目煖腰膝破痃癖癥瘕消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉 甄權主九種心痛腹內冷氣痛不可忍欬逆結氣壅痺脚痺不仁止下利殺三蟲治鼻中息肉破血通利月閉胞衣不下

疏○桂稟天地之陽而兼得乎土金之氣故其味甘辛其氣大熱亦有小毒木之純陽者也潔古謂其氣熱味大辛純陽東垣謂其辛

辛夷　桑上寄生　杜仲

楓香脂　女貞實 附枸骨　𥻗核

丁香　沉香　檀香

乳香　降眞香　蘇合香

金櫻子　放杖木

桂味辛甘大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脉理疏不足宣

燥其主利肝肺氣頭痛出汗止煩止唾欬嗽
鼻鼽理疎不足表虛自汗風痺骨節攣痛者
桂枝之所治也以其病皆得之表虛不任風
寒寒邪客之所致故悉主之以其能實表袪
邪也其主心腹寒熱冷疾霍亂轉筋腰痛墮
胎溫中堅筋骨通血脉宣導百藥無所畏又
補下焦不足治沉寒痼冷滲泄止渴去榮衛
中風寒秋冬下部腹痛因於寒補命門益火

熱有毒浮也氣之薄者桂枝也氣之厚者肉
桂也氣薄則發泄故桂枝上行而發表氣厚
則發熱故肉桂下行而補腎此天地親上親
下之道也桂枝入足太陽經桂心入手少陰
厥陰經血分桂肉入足少陰厥陰經血分夫
五味辛甘發散爲陽四氣熱亦屬陽氣味純
陽故能散風寒自內充外故能實表辛以散
之熱以行之甘以和之故能入血行血潤腎

之氣卽醫家所謂命門相火乃眞火也天非此火不能生物人非此火不能有生若無此眞陽之火則無以蒸糟粕而化精微脾胃之氣立盡而亡矣心腹寒熱寒邪在裏也冷疾霍亂轉筋者脾與肝同受寒邪也行二臟之氣則前證自止矣腰者腎之府動搖不能腎將憊矣補命門之眞陽則腰痛自除血熱則行故墮胎也益陽則溫中筋者肝之餘也骨

消陰者肉桂之所治也氣薄輕揚上浮達表故桂枝治邪客表分之爲病味厚甘辛大熱而下行走裏故肉桂桂心治命門眞火不足陽虛寒動於中及一切裏虛陰寒寒邪客裏之爲病蓋以肉桂桂心甘辛而大熱所以益陽甘入血分辛能橫走熱則通行合斯三者故善行血命門者心包絡也道家所謂兩腎中間一點明又曰先天祖氣是也先天眞陽

九竅不通關節不利者榮衛不調血分之病
也消瘀血破痃癖癥瘕疏導肝氣通行瘀血
之力也補五勞七傷者蓋指陽氣虛羸下陷
無實熱之候也其曰久服神仙不老甄權又
謂殺三蟲治鼻中息肉大明又謂益精明目
皆非其性之所宜也何者獨陽偏熱之質行
血破血乃其能事陰精不長則陽無所附安
所從得神仙不老哉味既帶甘焉能殺蟲鼻

者腎之餘也入肝入腎故堅筋骨也通血脉
宣導百藥無所畏者熱則通行辛則善散也
陽長則陰消氣之自然者也能益陽則消陰
必矣寒邪觸心則心痛陽虛氣不歸元因而
爲寒所中則腹內冷氣痛不可忍欬逆者亦
氣不歸元所致也結氣壅痺脚痺不仁者皆
寒溼邪客下焦榮衞不和之所生也血凝滯
而不行則月經不通血瘀不走則胞衣不下

歸川芎黃耆生地黃赤芍藥白殭蠶治金瘡
爲風寒所擊俗名破傷風　得朴硝當歸下
死胎　得蒲黃黑豆澤蘭益母草紅花牛膝
生地黃當歸治產後少腹兒枕作痛甚則加
乳香沒藥各七分　得吳茱萸乾薑附子治
元氣虛人中寒腹痛不可忍虛極則加人參
佐參耆五味當歸麥冬療瘡瘍潰後熱毒
巳盡內塞長肉良　入桂苓甘露飲治中暑

中息肉由於肺有積熱曈子神光屬腎肉桂
辛而大熱其不利於肺熱腎陰不足亦明矣
益精明目徒虛語耳盡信書則不如無書斯
之謂也

主治条互

得芍藥炙甘草飴糖黃耆則建中兼止榮弱
自汗　得石膏知母人參竹葉麥門冬治陽
明瘧渴欲引飲汗多寒熱俱甚　得白芷當

簡誤

桂辛甘其氣大熱獨熱偏陽表裏俱達和榮氣散表邪出汗實腠理則桂枝爲長故仲景專用以治冬月傷風寒即病邪在表者冦宗奭成無巳論之詳矣一覽可盡因附之於後肉桂桂心實一物也秪去皮耳此則走裏行血除寒破血平肝入右腎命門補相火不足其功能也然大忌於血崩血淋尿血陰虛吐

霍亂吐瀉殊驗　得薑黃鬱金治怒氣傷肝
脇痛　得當歸牛膝治冬月難產產門交骨
不開　得當歸牛膝生地黃乳香沒藥桃仁
治跌撲損傷瘀血凝滯腹中作痛或惱怒勞
傷以致蓄血發寒熱熱極令人不得眠腹不
痛大便不秘亦不甚渴脉不洪數不思食食
亦無味熱至天明得汗暫止少頃復熱小便
赤此其候也和童子小便服之立除

虛寒熱往來口苦舌乾婦人血熱經行作痛男婦陰虛內熱外寒中暑瀉利暴注如火熱一切滯下純血由於心經伏熱腸風下血臟毒便血陽厥似陰夢遺精滑虛陽數舉脫陰目盲等三十餘證法並忌之誤投則禍不旋踵謹察病因用舍在斷行其所明無行所疑其難其慎毋嘗試也

附寇宗奭曰桂辛甘大熱素問云辛甘發散

血咯血鼻衄齒衄汗血小便因熱不利大便
因熱燥結肺熱欬嗽產後去血過多及產後
血虛發熱小產後血虛寒熱陰虛五心煩熱
似中風口眼歪斜失音不語語言蹇澀手足
偏枯中暑昏暈中熱腹痛婦人陰虛少腹痛
一切瘟病熱病頭疼口渴陽證發斑發狂小
兒痧疹腹疼作瀉痘瘡血熱乾枯黑陷婦人
血熱經行先期婦人陰虛內熱經閉婦人陰

桂枝甘草湯此又用桂枝閉汗也一藥二用與本草之義相通否乎曰本草言桂辛甘大熱能宣導百藥通血脉止煩出汗是調其血而汗自出也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛實榮虛故發熱汗出又云太陽病發熱汗出者此爲榮弱衛强陰虛陽必湊之故皆用桂枝發其汗此乃調其榮氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非桂枝能開腠理

爲陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須
此藥正合辛甘發散之意本草三種之桂不
用菌桂牡桂者此二種性止於溫不可以治
風寒之病也然本經止言桂仲景又言桂枝
者取枝上皮也好古曰或問本草言桂能止
煩出汗而張仲景治傷寒有當發汗凡數處
皆用桂枝湯又云無汗不得用桂枝汗家不
得重發汗若用桂枝是重發其汗汗多者用

者不可與此必也皮膚疎泄自汗脉浮緩風
邪干於衛氣者乃可投之發散以辛甘爲主
桂枝辛熱故以爲君而以芍藥爲臣甘草爲
佐者風淫所勝平以辛苦以甘緩之以酸收
之也以薑棗爲使者辛甘能發散而又用其
行脾胃之津液而和榮衛不專於發散也故
麻黄湯不用薑棗專於發汗不待行其津液
也

發出其汗也汗多用桂枝者以之調和榮衛
則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也
昧者不知出汗閉汗之意遇傷寒無汗者亦
用桂枝誤之甚矣桂枝湯下發汗發字當認
作出字汗自然出非若麻黃能開腠理發出
其汗也其治虛汗亦當逆察其意可也成無
巳曰桂枝本爲解肌者大陽中風腠理緻密
榮衛邪實津液禁固其脉浮緊發熱汗不出

則咽乾消渴自止痺者風寒溼合而爲病也地之溼氣感則害人皮肉筋脉此死肌之所由來也溼熱之邪散則血不瘀敗榮氣通調而無壅滯故主疽惡瘡榮和熱散則頭瘍白禿疥瘙風氣俱愈矣熱消則榮血和風溼去則衞氣安脾胃健五臟無病可知溼去則身輕可必久服不老延年固可想見

○松實味甘氣溫性和而無毒本經言苦者誤

松脂味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白秃疥瘙風氣安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌煉之令白其赤者主惡痺久服輕身不老延年

疏〇松脂感天之陽氣而得乎地之火土之化者也故其味苦而兼甘其氣則溫其性無毒得陽氣兼火土則其性燥燥則除溼散風寒苦而燥則能殺蟲甘能除熱胃中伏熱散

○松節味苦氣溫性燥故能主百節久風風虛脚痺疼痛

主治參互

陶弘景以松節釀酒主脚弱骨節風　丹溪以松節炒焦用以治筋骨閒病能燥血中之溼　外臺秘要治歷節風痛四肢如解脫松節二十斤酒五斗浸三七日每服一合日五六服　集簡方治陰毒腹痛油松木七塊炒

也以其屬陽故亦主風痺寒氣其主虛羸少氣補不足者精不足補之以味甘能益血是已形不足溫之以氣溫能和氣是已服餌延年輕身不饑惟此足以當之然亦久服乃可責效耳

○松葉味苦溫而不甘宜其主風溼瘡生毛髮也安五臟守中不饑延年其旨具松脂條內服之可治惡疾即癩病灸𤸎凍瘡風瘡佳

如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服明目益
氣頭不白延年　枝主洗瘡及陰囊下溼癢
皮主爛瘡　根主喉痺寒熱　花苦平無毒主
五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風併腸
風瀉血赤白痢並炒服　葉平無毒煎湯治小
兒驚癇壯熱疥癬及疔腫

疏○槐實感天地陰寒之氣而兼木與水之
化故其味苦氣寒而無毒別錄益以酸鹹宜

焦衝酒二鍾熱服　談埜翁方跌撲損傷松節煎酒服

簡誤

松脂松葉其性甚燥味又苦溫病人血虛有火及病不關風寒溼所傷而成者咸不宜服

槐實味苦酸醎寒無毒主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之搗取汁銅器盛之日煎令可作丸大

無熱則目自明矣熱能傷氣除火熱則氣自益矣凉血則髮不白熱去則陰精不損故引年也其花味以苦勝故除手足陽明足厥陰諸熱證尤長耳

主治条互

外臺秘要療蚘蟲心痛取槐樹上木耳燒灰末如棗許正發和水服若不止飲熱水一升蚘蟲出　千金方療胎赤眼取槐枝如馬鞭

矣入手足陽明兼入足厥陰經其主五內邪
氣熱者乃熱邪實也涎唾多者脾胃有熱也
傷絕之病其血必熱五痔由於大腸火熱火
瘡乃血爲火傷婦人乳瘕肝家氣結血熱所
成子藏急痛由於血熱燥火槐爲苦寒純陰
之藥爲凉血要品故能除一切熱散一切結
清一切火如上諸病莫不由斯三者而成故
悉主之久服明目益氣頭不白延年者血分

及諸惡瘡　肘後方療腸痔大便常下血槐
樹上木耳取末飲方寸匕日三服　經驗方
治野雞痔用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾灸
之七壯　又方治下血槐花荆芥穗等分爲
末酒調下一錢匕　梅師方治痔有蟲作癢
或下膿血多取槐白皮濃煎汁安盆內先熏
後洗良久欲大便當有蟲出不過三度卽愈
仍以其皮爲末綿裹內下部　孟詵必效方

大長二尺作二段齊頭蔴油一匙置銅鉢內
晨使童子一人以其木研之至暝乃止令仰
臥以塗兩眼背日三度差　古方以子入冬
月牛膽中漬之陰乾百日每日吞一粒久服
明目通神白髮還黑有痔及下血者尤宜服
之　千金方治九種心痛當太歲上取新生
槐枝一握去兩頭水三大升煎取一升頓服
千金翼治蠼螋瘡槐白皮醋浸半日洗之

治目熱昏暗槐子黃連各二兩爲末蜜丸梧
子大每漿水下二十九日二服　楊梅毒瘡
乃陽明積熱所生集簡方用槐花四兩略炒
入酒二盞煎十餘沸熱服胃虛寒者勿服
醫方摘要療疔瘡腫毒一切癰疽不問已成
未成但焮痛者皆用槐花微炒核桃仁二兩
無灰酒一鍾煎十餘沸熱服未成者二三服
已成者一二服見效　摘玄方治白帶槐花

療陰瘡溼癢槐樹北面不見日枝煎水洗三五遍冷再煖之　太淸草木方云槐者虛星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神又梁書言庾肩吾常服槐實年七十餘髮鬢皆黑目看細字亦其驗也　外臺秘要療內外痔用槐角子一斗擣汁曬稠取地膽爲末同擣丸梧子大每服十九兼作挺子內下部或以苦參末代地膽亦可　聖濟總錄

陰虛血熱而非實熱者外證似同內因實異

即不宜服

枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣

熱中消渴周痺風溼下胸脇氣客熱頭痛補內

傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋

骨輕身不老耐寒暑

疏○枸杞感天令春寒之氣兼得乎地之冲

氣故其味苦甘其氣寒而其性無毒苗葉苦

炒牡蠣煅等分爲末酒服三錢　聖惠方治
風熱牙痛槐枝燒熱烙之　普濟方療破傷
風用避陰槐枝上皮旋刻一片安傷處用艾
灸皮上百壯不痛灸至痛痛者灸至不痛用
火摩之　生生方治陰下溼癢槐白皮炒煎
水日洗

簡誤

槐性苦寒而屬純陰病人虛寒脾胃作泄及

除熱故也至於補內傷大勞噓吸堅筋骨强
陰利大小腸又久服堅筋骨輕身不老耐寒
暑者方是子之功用而非根葉所能辦矣老
人陰虛者十之七八故服食家爲益精明目
之上品昔人多謂其能生精益氣除陰虛內
熱明目者蓋熱退則陰生陰生則精血自長
肝開竅於目黑水神光屬腎二臟之陰氣增
益則目自明矣

甘性升且凉故主清上焦心肺客熱根名地
骨味甘淡性沉而大寒故主下焦肝腎虛熱
爲三焦氣分之藥經曰熱淫於內瀉以甘寒
者是巳子味甘平其氣微寒潤而滋補兼能
退熱而專於補腎潤肺生津益氣爲肝腎眞
陰不足勞乏之內熱補益之要藥本經主五內
邪氣熱中消渴周痺別錄主風溼下胸脇氣
客熱頭痛當指葉與地骨皮而言以其寒能

二斗入鍋煎如餳收之每早酒服一合　經驗方金髓煎枸杞子逐日摘紅熟者不拘多少以無灰酒浸之蠟紙封固勿令洩氣兩月足取入砂盆中擂爛濾取汁同浸酒入銀鍋內慢火熬之不住手攪恐黏滯不匀候成膏如餳淨瓶密收每早溫酒服二大匙夜臥再服百日身輕氣壯積年不輟可以羽化也

經驗方枸杞酒變白耐老輕身用枸杞子二

主治叅互

甘枸杞子得地黃五味子麥門冬地骨皮青蒿鼈甲牛膝爲除虛勞內熱或發寒熱之要藥加天門冬百部枇杷葉兼可治肺熱欬嗽之因陰虛者　千金方枸杞煎治虛勞退虛熱輕身益氣令一切癰疽永不發用枸杞三十斤春夏用莖葉秋冬用根實以水一石煑取五斗以滓再煎取三斗澄清去滓再煎取

枸杞加熟地黃白朮白茯苓各一兩爲末煉
蜜丸日服　龍木論療肝虛下淚枸杞子二
斤絹袋盛浸一斗酒中密封三七日飲之
肘後方療目赤生翳枸杞搗汁日點三四次
神驗　聖惠方治面黯皯皰枸杞子十斤生
地三斤爲末每服方寸匕溫酒下日三服久
則如童顏　攝生方療注夏虛病枸杞子五
味子研細滾水泡代茶飲效　千金方治虛

升十月壬癸日面東採之以好酒二升磁瓶
內浸三七日乃添生地黃汁三升攪勻密封
至立春前三十日開瓶每空心煖飲一杯至
立春後髭髮却黑勿食蕪菁葱蒜　瑞竹堂
方四神丸治腎經虛損眼目昏花或雲瞖遮
睛甘枸杞子一斤好酒浸透分作四分一分
同蜀椒一兩炒一分同小茴香一兩炒一分
同芝蔴一兩炒一分同川楝肉一兩炒揀取

食前溫服　千金方治帶下脉數枸杞根一
斤生地黄五斤酒一斗煑五升日日飲之
蘭臺秘藏治口舌糜爛因膀胱移熱於小腸
則上為口糜心胃壅熱水穀不下地骨皮柴
胡各三錢水煎服之　衛生寶鑑療下疳先
以漿水洗之後掺地骨皮末生肌止痛　永
類方療婦人陰腫或生瘡枸杞根煎水頻洗
唐慎微本草療癰疽惡瘡膿血不止地骨

勞客熱枸杞根爲末白湯調服有瘤疾人愼之　又方治虛勞苦渴骨節煩熱或寒用枸杞根白皮切五升麥冬三升小麥二升水二斗煑至麥熟去滓每服一升口渴卽飮　又方治腎虛腰痛枸杞根杜仲萆薢各一斤好酒三斗漬之罌中密封鍋口煑一日飮之任意　簡便方療小便出血鮮地骨皮洗擣自然汁無汁則以水煎汁每服一盞入酒少許

挼汁以桑葉裹懸陰地一夜取汁點之不過
三五度
簡誤
枸杞雖爲益陰除熱之上藥若病脾胃薄弱
時時泄瀉者勿入須先治其脾胃俟泄瀉已
止乃可用之即用尚須同山藥蓮肉車前茯
苓相兼則無潤腸之患矣
栢實味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除風溼

皮洗淨刮去粗皮取細白瓤以粗皮同骨煎

湯洗令膿血盡以細瓤貼之立效　千金方

治瘭疽出汗此證手足肩背纍纍如赤豆用

枸杞根葵根葉煑汁煎如餳隨意服之　閨

閤事宜治足趾雞眼作瘡作痛地骨皮同紅

花研細傅之次日即愈　肘後方治火赫毒

瘡此患急防毒氣入心腹枸杞擣汁服之立

瘥　十便良方治目澀有翳枸杞葉車前葉

足厥陰少陰亦入手少陰經其主驚悸者心藏神腎藏精與志心腎兩虛則病驚悸入心故養神入腎故定志神志得所養而寧定則其證自除矣芬芳則脾胃所喜潤澤則肝腎所宜故能安五臟五臟皆安則氣自益矣心主五色耳爲腎竅目爲肝竅加以久服氣專其力自倍豈不令人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年哉惟除風淫痺之功非潤

痺療恍忽虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年　葉味苦微溫無毒主吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去溼痺生肌四時各依方面採陰乾　栢白皮主火灼爛瘡長毛髮

疏○栢感秋令得金氣其質堅而氣極芬芳故其實味甘平無毒甄權加辛亦應有之入

主治參互

雷斅云栢葉有花栢葉叢栢葉及有子圓葉其有子圓葉成片如大片雲母葉皆側葉上有微赤毛者宜入藥用栢實凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾用黃精自然汁於日中煎之緩火煮成煎爲度每煎栢子仁三兩用酒五兩浸　服栢實法九月連房取實曝收去殼研末每服二錢溫酒下一日三服渴即

藥所能當是葉之能事耳別錄療恍忽卽驚
悸之漸也虛損吸吸精氣微也歷節腰中重
痛肝腎不足也汗乃心液心主血益陰血則
諸證悉瘥矣　葉味苦而微溫義應並於微
寒故得主諸血崩中赤白若夫輕身益氣令
人耐寒暑則畧同於栢實之性矣惟生肌去
溼痺乃其獨擅之長也　栢白皮主火灼爛
瘡長毛髮者凉血之功也

疼痛止尿血　日華子用以炙署凍瘡燒取
汁塗頭黑潤鬢髮　蘇頌用以傅湯火傷止
痛滅瘢服之療蠱痢作湯常服殺五臟蟲益
人　丹溪云栢屬陰與金善守故採其葉隨
月建方取其多得月令之氣此補陰之要藥
其性多燥久得之大益脾土以滋其肺　神
仙服餌方五月五日採五方側栢葉三斤遠
志去心二斤白茯苓一斤爲末煉蜜和丸梧

飲水令人悅澤一方加松子仁等分以松脂
和丸一方加菊花等分蜜丸服　寇宗奭治
老人虛閉栢子仁松子仁大麻仁等分同研
鎔蜜蠟丸梧子大以少黃丹湯食前服二三
十丸日二服　普濟方治小兒軀啼驚癇腹
滿大便青苔色用栢子仁末溫水調服一錢
　陸氏積德堂方治黃水溼瘡眞栢油二兩
熬稠搽之如神　葉甄權用以治冷風歷節

百一選方治大腸下血隨四時方向採栢
葉燒研每米飲服二錢王渙之舒州病此陳
宜父大夫傳方二服愈　又方以栢葉一斤
搗令極勻加蜜丸如梧子大每五錢白湯空
心吞治腸風效　普濟方治酒毒下血或下
痢嫩栢葉九蒸九曬二兩陳槐花炒焦一兩
爲末蜜丸梧子大每空心溫酒下四十九
本草圖經治蠱痢下黑血茶脚色或膿血如

子大每以仙靈脾酒下三十丸日再服益無
所忌　楊氏家藏方治中風不省人事得病
之日便進此藥可使風退氣和不成廢人栢
藥一握去枝葯白一握連根研如泥無灰酒
一升煎一二十沸溫服如不飲酒分作四五
服方進他藥　聖惠方治憂恚吐血煩滿少
氣脇中疼痛栢葉爲散米飲調服二方寸匕
普濟方治衄血不止栢葉榴花研末吹之

髮黃赤生側栢葉末一升猪膏一升和丸彈

子大每以布裹一丸納泔汁中化開沐之一

月色黑而潤矣

簡誤

栢子仁體性多油腸滑作瀉者勿服膈間多

痰者勿服陽道數舉腎家有熱暑溼作瀉法

咸忌之已油者勿用入藥

茯苓味甘平無毒主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸

靛色栢葉焙乾爲末黃連和煎爲汁服之
經驗方治小兒洞痢栢葉煑汁代茶飲之
本草圖經治湯火灼燒栢葉生擣塗之繫定
二三日止痛滅瘢　姚僧坦集驗方治鼠瘻
核痛未成膿以栢葉擣塗熬鹽熨之氣下卽
消　聖惠方治大風厲疾眉髮不生側栢葉
九蒸九曬爲末煉蜜丸梧子大每服五丸至
十丸日三夜一服百日卽生　聖惠方治頭

陽足太陰陽明經陽中之陰也胸脇逆氣邪
在手少陰也憂恚驚邪皆心氣不足也恐悸
者腎志不足也心下結痛寒熱煩滿欬逆口
焦舌乾亦手少陰受邪也甘能補中淡而利
竅補中則心脾實利竅則邪熱解心脾實則
憂恚驚邪自止邪熱解則心下結痛寒熱煩
滿欬逆口焦舌乾自除中焦受溼熱則口發
渴溼在脾脾氣弱則好睡大腹者脾土虛不

心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止
消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸
腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久服
安魂養神不饑延年其有抱根者名茯神
茯神平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚
悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神
疏○茯苓生於古松之下感土木之氣而成
質故其味甘平性則無毒入手足少陰手太

通利小腸○專除溼熱○赤亦勝白○藥性論云茯
苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神主肺
痿痰壅治小兒驚癎療心腹脹滿婦人熱淋
赤者破結氣日華子云茯苓補五勞七傷安
胎煖腰膝開心益智止健忘　茯神抱木心
而生以此別於茯苓別錄謂茯神平總之其
氣味與性應是茯苓一體茯苓入脾腎之用
多○茯神入心之用多○故主辟不祥療風眩風

能利水故腹脹大也淋瀝者脾受溼邪則水道不利也膈中痰水水腫皆緣脾虛所致中焦者脾土之所治也中焦不治故見斯病利水實脾則其證自退矣開胸腑調臟氣伐腎邪者何莫非利水除溼解熱散結之功也長陰益氣力保神守中久服安魂養神不饑延年者補心脾伐腎邪除溼利竅之極功也白者入氣分赤者入血分補心益脾白優於赤

不饑　入五苓散利水除溼暑氣勝則去桂
　得人參白朮橘皮山藥藊豆芍藥甘草爲
補脾胃之上藥　得二朮澤瀉車前白芍藥
橘皮木瓜猪苓爲消水腫之要劑　入六味
地黃丸能伐腎邪　入補心丹則補心安魂
養神　百一選方朱雀丸治心神不定恍惚
健忘不樂火不下降水不上升時復振跳常
服消陰養火全心氣茯神二兩去皮沉香半

虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智
安魂魄養精神藥性論又云茯神君味甘無
毒主驚癇安神定志補勞乏主心下急痛堅
滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松
節治偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚
掣虛而健忘其所主與茯苓大同小異耳
主治參互
白茯苓得煉蜜胡麻仁餌之可以辟穀延年

作匱以猪苓四錢半入内煮二十餘沸取出
日乾去猪苓爲末化黄蠟搜和丸彈子大每
嚼一丸空心津下以小便清爲度忌米醋
三因方治小便淋濁由心腎氣虚神志不守
或夢遺白濁赤白茯苓等分爲末新汲水飛
去沫控乾以地黄汁同擣酒熬作膏和丸彈
子大空心鹽湯嚼下一丸　禹講師方治妊
娠水腫小便不利惡寒赤茯苓去皮葵子各

兩爲末煉蜜丸小豆大每服三十丸食後人參湯下　證治要訣治血虛心汗別處無汗獨心孔有汗思慮多則汗亦多宜養心血以艾湯調茯苓末服一錢　直指方治心虛夢洩或白濁白茯苓末二錢米湯調下日二服東坡方也　威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不固小便下濁餘瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫白帶並治之白茯苓去皮四兩

病人腎虛小水自利或不禁或虛寒精清滑皆不得服

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋

疏〇琥珀感土木之氣而兼火化故其味甘平無毒而色赤陽中微陰降也入手少陰太陽亦入足厥陰經專入血分五臟有所感觸則不安能殺精魅邪鬼則五臟自安而魂魄

半兩爲末每服二錢新汲水下　普濟方治
卒然耳聾黃蠟不拘多少和茯苓末細嚼茶
湯下　夏子益奇疾方治血餘怪證十指節
斷壞惟有筋連無節肉蟲出如燈心長數寸
遍身綠毛卷名曰血餘以茯苓胡黃連煎湯
飲之愈　普濟方治水腫尿澀茯苓皮椒目
等分煎湯日飲取效

簡誤

結性溫主止血生肌鎭心明目破癥瘕氣塊

產後血暈悶絶兒枕痛等竝宜餌此以拾草

通明而堅輕色赤者良

主治參互

得沒藥乳香延胡索乾漆鼈甲爲散治產後

血暈有神佐以人參益母草澤蘭生地牛膝

當歸蘇木作湯送前藥則治兒枕痛惡露不

不盡腹痛少腹痛寒熱等證極效　和大黃

自定心主血肝藏血入心入肝故能消瘀血
也藥性論云琥珀君治百邪產後血瘀作痛
日華子云療蠱毒壯心明目磨翳止心痛癲
邪破結癥正以其陽明之物又消瘀血故主
上來諸病也若作傅藥能止血生肌合金瘡
宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傅金
瘡其一證也出罽賓國初如桃膠凝乃成焉
海藥云是海松木中津液初如桃膠後乃凝

諸癎　直指方治小兒胎驚琥珀防風各一
錢丹砂半錢爲末猪乳調一字入口中最妙
　又方治小兒胎癎琥珀丹砂各少許全蝎
一枚爲末麥門冬湯調一字服　聖惠方治
小兒轉胞眞琥珀一兩爲末用水四升葱白
十莖煑汁三升入琥珀末二錢溫服砂石諸
淋三服皆效　普濟方小便淋瀝琥珀爲末
二錢麝香少許白湯服之或萱草煎湯服老

鼈甲作散子酒下方寸匕下婦人腹內惡血
同鼈甲京三稜各一兩沒藥延胡索各半
兩大黃六銖熬搗爲散空心酒服三錢治婦
人癥瘕氣塊及產後血暈悶絕兒枕痛甚虛
極者減大黃　同丹砂滑石竹葉麥冬木通
治心家有熱小腸受之因之小水不利立效
同人爪珍珠瑪瑙珊瑚除目翳赤障　得
丹砂犀角羚羊角天竺黃遠志茯神鎮驚主

水從金石鎭墜藥則鎭心安神凡陰虛內熱火炎水涸小便因少而不利者勿服琥珀以强利之利之則愈損其陰

酸棗仁味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼溼痺煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣能令人肥健久服安五藏輕身延年

疏○酸棗仁得木之氣而兼土化故其實酸

人虛人以人參湯下亦可蜜丸以赤茯苓湯

下　外臺秘要治從高墜下有瘀血在內刮

琥珀屑酒服方寸匕或入蒲黃二三匙日服

四五次　鬼遺方治金瘡悶絕不識人琥珀

研粉童子小便調一錢三服瘥

簡誤

此藥畢竟是消磨滲利之性不利虛人大都

從辛溫藥則行血破血從淡滲藥則利竅行

服之功能安五臟輕身延年也别錄主煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣能令人肥健者緣諸證悉由肝膽脾三臟虛而發膽主升肝藏血脾統血三臟得補久而氣增氣增則滿足故主如上功能也

主治參互

君茯神遠志麥門冬、石斛五味子龍眼人參

平仁則兼甘氣味匀齊其性無毒爲陽中之
陰入足少陽手少陰足厥陰太陰之經專補
肝膽亦復醒脾從其類也熟則芳香香氣入
脾故能歸脾能補膽氣故可溫膽母子之氣
相通故亦主虛煩煩心不得眠其主心腹寒
熱邪結氣聚及四肢酸疼溼痺者皆脾虛受
邪之病脾主四肢故也膽爲諸臟之首十一
臟皆取決於膽五臟之精氣皆稟於脾故久

中汗出卽盜汗用酸棗仁白茯苓人參等分
爲末每服一錢米飲下　外臺秘要療剌入
肉中棗仁核燒存性爲細末水服之立出

簡誤

凡肝膽脾三經有實邪熱者勿用以其收歛
故也

蘗木黃蘗也味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃
癉腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡療驚

能止驚悸并一切膽虛易驚　入溫膽湯治
病後膽虛不眠　入歸脾湯治脾家氣血虛
自汗不眠驚悸不嗜食　太平聖惠方治骨
蒸不眠心煩用酸棗仁一兩炒研水二盞研
絞取汁煮粥熟下地黃汁一合再煮匀食
凡服固表藥而汗不止者用棗仁一兩炒研
同地黃白芍藥麥冬五味子龍眼肉竹葉煎
服多服取效汗乃心液故爾　簡便方治睡

濕熱乘陰虛流客下部而成膚熱赤起目熱赤痛口瘡皆陰虛血熱所生病也以至陰之氣補至陰之不足虛則補之以類相從故陰回熱解濕燥而諸證自除矣乃足少陰腎經之要藥專治陰虛生內熱諸證功烈甚偉非常藥可比也潔古用以瀉膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸痿癱痪利下竅除熱東垣用以瀉伏火救腎水治衝脉氣

氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛眥瘍久服通
神
疏○黃檗禀至陰之氣而得清寒之性者也
其味苦其氣寒其性無毒故應主五臟腸胃
中結熱蓋陰不足則熱始結於腸胃黃癉雖
由溼熱然必發於眞陰不足之人腸澼痔漏
亦皆溼熱傷血所致洩痢者滯下也亦溼熱
干犯腸胃之病女子漏下赤白陰傷蝕瘡皆

黃蒺藜女貞實則益精明目　得猪膽汁水銀粉則主諸熱瘡有蟲久不合口　得鉛丹則生肌止痛　得木瓜茯苓二朮石斛地黃則除溼健步　佐白芍藥甘草則主火熱腹痛　外臺秘要治口中及舌上生瘡剉黃蘗含之　千金方治小兒重舌以黃蘗苦竹瀝浸點舌上　肘後方治咽喉卒腫食飲不通黃蘗搗末苦酒和敷腫上佳　又方治傷寒

逆不渴而小便不通諸癃痛不可忍丹溪謂
得知母滋陰降火得蒼朮除溼清熱爲治痿
要藥得細辛瀉膀胱火治口舌生瘡

主治參互

黄蘗爲足少陰腎經藥然以柴胡引之則入
膽以黄連葛根升麻引之則入腸胃及太陰
脾經治溼熱滯下　佐牛膝枸杞地黄五味
子鼈甲青蒿則益陰除熱　佐甘菊枸杞地

兩蜜炙擣末每服二錢溫糯米飲調下　十
全博救方治小兒熱瀉黃蘗削皮焙爲末用
薄米飲丸如粟大每服十丸米飲下　深師
方治傷寒熱病口瘡黃蘗削去粗皮蜜漬一
宿唯欲令濃含其汁良久吐更含若胸中熱
有瘡時飲三五合尤佳　衍義云蘗木今用
皮以蜜炙與青黛各一分同爲末入生龍腦
一字研勻治心脾熱舌頰生瘡當摻瘡上有

時氣溫病毒攻手足腫痛欲斷亦治毒攻陰
腫細剉黃蘗五斤以水三斗煑漬之傷寒類
要同　葛氏方治食自死六畜肉中毒黃蘗
末服方寸匕未解再服之　經驗方治嘔血
黃蘗蜜塗炙乾杵爲末用麥冬湯調下二錢
匕立瘥　梅師方治癰疽發背或發乳房初
起微赤不急治之即殺人搗黃蘗末和雞子
白塗之　簡要濟衆方治吐血熱極黃蘗二

補腎也又方加知母炒牡蠣煅山藥炒等分
爲末糊丸梧子大每服八十丸鹽湯下　許
學士本事方治積熱夢遺心忪恍忽膈中有
熱宜清心丸𡈽之黄蘗末一兩片腦一錢煉
蜜丸梧子大每服十五丸麥冬湯下此大智
禪師方也　三因方治口瘡臭爛綠雲散黄
蘗五錢銅綠二錢爲末摻之漱去涎　聖惠
方治鼻疳有蟲黄蘗二兩冷水浸一宿絞汁

涎即吐又張仲景蘗皮湯無不驗傷寒論中
已著　婦人良方治妊娠下痢白色晝夜三
五十行根黃厚者蜜炒令焦爲末大蒜煨熟
去皮搗爛如泥和丸梧子大每空心米飲下
三五十丸日三服神妙不可述　潔古家珍
治赤白濁淫及夢洩精滑眞珠粉丸黃蘗炒
眞蛤粉各一斤爲末煉蜜丸菉豆大每服一
百丸空心溫酒下黃蘗苦而降火蛤粉鹹而

識者用此而愈　宣明方斂瘡生肌黃蘗末
麪糊調塗效

簡誤

黃蘗因能除熱益陰然陰陽兩虛之人病兼
脾胃薄弱飲食少進及食不消或兼泄瀉或
惡冷物及好熱食腎虛天明作泄上熱下寒
小便不禁少腹冷痛子宮寒血虛不孕陽虛
發熱瘀血停滯產後血虛發熱金瘡發熱癰

溫服　普濟方治髼毛毒瘡生頭中初生如
蒲桃痛甚黃蘗一兩乳香二錢半爲末槐花
煎水調作餅貼於瘡上　子母秘錄治小兒
臍瘡不合者黃蘗末塗之　又方治膁瘡熱
瘡黃蘗末一兩輕粉三錢豬膽汁調搽之或
只用蜜炙黃蘗末一味　張杲醫說治火毒
生瘡凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡其
汁淋漓用黃蘗末摻之立愈一婦生此人無

肌肉不充土虛則水溼泛濫甘爲土化能入脾堅土則水腫消肌肉充氣自益矣明目者目得血而能視脾旺自能生血也陰痿者精氣竭也脾實則能生精而灌注於腎故陰自強也補脾益氣則五臟皆實不饑不老輕身是其驗矣

主治參互

活法機要治水氣蠱脹楮實子丸以潔淨府

疽潰後發熱傷食發熱陰虛小水不利痘後
脾虛小水不利血虛不得眠血虛煩躁脾陰
不足作泄等證法咸忌之

楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明
目久服不饑不老輕身

疏○楮實禀土氣以生故其味甘氣寒無毒
氣薄味厚陰也降也入足太陰經其主水腫
益氣充肌膚者脾爲土臟而主肌肉脾虛則

秘要治天行病後兩脇脹滿臍下如水腫以
穀枝汁隨意服愈　肘後方治鼻衄小勞輒
出楮葉取汁飲三升良　子母秘錄治小兒
下痢赤白作渴得水又嘔逆者構葉炙香以
飲漿半升浸至水綠去葉以木瓜一箇切內
汁中煑二三沸去木瓜細細飲之　聖惠方
治通身水腫楮枝葉煎如餳空腹服一匕日
三服　直指方肝熱生翳楮實研細食後蜜

用楮實一斗水三斗熬成膏茯苓三兩白丁香一兩半爲末以膏和丸梧子大從少至多至小便清利脹減爲度後服治中湯養之忌甘苦峻補及發動之物　劉禹錫傳信方治女子月經不絕來無時者取案紙三十張燒灰以清酒半升和調服之頓定蓐中血暈服之立驗已斃者去板齒灌之經一日亦活　外臺聖惠方治癬溼癢用楮葉搗爛傅上

疏○乾漆稟火金之氣以生故其味辛氣溫火金相搏則未免有毒別錄言之爲當矣甄權加鹹宗奭加苦氣味俱厚通行腸胃入肝行血之藥也凡風寒溼邪之中人留而不去則腸胃鬱而生蟲久則五臟六腑皆受病或爲癱瘓或爲拘攣所自來矣此藥能殺蟲消散逐腸胃一切有形之積滯腸胃既清則五臟自安痿緩痺急自調矣又損傷一證專從

湯服一錢日再服　外臺秘要治金瘡出血

轂子擣傳之

簡誤

楮實雖能消水補脾然氣亦微寒脾胃虛寒

者不宜用

乾漆味辛溫無毒有毒主絕傷補中續筋骨填

髓腦安五藏五緩六急風寒溼痺療欬嗽消瘀

血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去蚘蟲

蟹及甘豆湯解之

主治參互

同䗪蟲桃仁當歸紅花蘇木牡丹皮五靈脂延胡索牛膝治腹中瘀血作痛或產後感寒惡露未盡結成痞塊作痛者加入乾薑澤蘭

同楝根鶴蝨檳榔錫灰薏苡根烏梅龍膽草能殺腸胃一切諸蟲

同牛膝牡丹皮續斷赤芍藥桃仁乳香沒藥紅花延胡索鼈甲

血論蓋血者有形者也形質受病惟辛溫散
結而兼鹹味者可入血分而消之瘀血消則
絕傷自和筋骨自續而髓腦自足矣其主癥
結腹痛女子疝瘕者亦指下焦血分受寒血
凝所致利小腸者取其通行經脉之功耳至
於療咳嗽雖非正治然亦有瘀血停積發爲
骨蒸勞瘵以致咳嗽者得其消散瘀血之力
則骨蒸退而咳嗽亦除也誤中漆毒者多食

堄阻塞者切勿輕餌

○漆葉味辛無毒圖經曰彭城樊阿少師事華陀陀授以漆葉青黏散云服之去三蟲利五臟輕身益氣使人頭不白

五加皮味辛溫微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒不能行疽瘡陰蝕男子陰痿囊下溼小便餘瀝女人陰癢及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨强志意久服輕

治女子月閉因於瘀血臍腹作痛畏寒及不發熱不口渴者可加桂　同豨薟葉生地黃半枝蓮胡麻荆芥何首烏天門冬苦參可療紫雲風　入仲景大黃䗪蟲丸中治五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食內有乾血肌膚甲錯

簡誤

乾漆味辛有毒瘀血得之即化成水其消散之功可知凡經閉由於血虛而非有瘀血結

兩脚疼痺風弱者何莫非二經受風寒溼邪所致經云傷於溼者下先受之又云地之溼氣感則害人皮肉筋脉肝腎居下而主筋骨故風寒溼之邪多自二經先受此藥辛能散風溫能除寒苦能燥溼二臟得其氣而諸證悉瘳矣又溼氣浸淫則五臟筋脉緩縱溼氣留中則虛羸氣乏之溼邪旣去則中焦治而筋骨自堅氣日益而中自補也其主益精強志

身耐老

疏○五加皮在天得少陽之氣爲五車星之精在地得火金之味故其味辛其氣溫而其性無毒別錄加苦微寒氣味俱厚沉而陰也入足少陰足厥陰經觀本經所主諸證皆因風寒溼邪傷於二經之故而溼氣尤爲最也其治疝氣腹痛療躄小兒不能行陰蝕疽瘡男子陰痿囊下溼小便餘瀝女人陰癢脊痛

得牛膝木瓜黃蘗麥門冬生地黃薏苡仁石
斛虎脛骨山藥治溼熱痿痺腰已下不能行
動　同續斷杜仲牛膝山茱萸巴戟天破故
紙治腎虛寒溼客之作腰痛　同二术萆薢
石菖蒲薏苡仁白蒺藜甘菊花防風羌活獨
活白蘚皮石斛治風寒溼成痺　同石菖蒲
連翹蒼朮黃蘗黃耆薏苡仁金銀花鼈蝨胡
麻木瓜土茯苓治下部溼瘡久不愈兼治膿

者腎藏精與志也輕身者除風溼之效也耐
老者補肝腎之功也昔人云寧得一把五加
不用金銀滿車寧得一斤地榆安用明月寶
珠又昔魯定公母單服五加酒以致不死又
東華眞人煮石法用玉豉金鹽玉豉地榆也
金鹽五加也世爲僊經所須其能輕身耐老
又可知矣

主治參互

而有火者亦忌之

牡荊實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣得朮柏實青葙共療頭風防風爲之使

疏○牡荊實感仲夏之氣以生故其味苦氣溫無毒可升可降陽也入足陽明厥陰經其主骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣者蓋足陽明爲十二經脈之長厥陰爲風木之位外邪傷於二經則寒熱留連於筋骨而胃氣壅

窠瘡如神　同黃蘗末菖蒲末蛇床子俱爲

細末傅囊溼神效如欲作湯沐加荊芥苦參

防風　一味釀酒飲之治風痺四肢拘攣

全幼心鑑治小兒三歲不能行用此便走五

加皮五錢牛膝木瓜各二錢半爲末每服五

分米飲入酒二三滴調服

簡誤

下部無風寒溼邪而有火者不宜用肝腎虛

簡誤
病非干外邪者一槩不宜用
蔓荆實味苦辛微寒平溫無毒主筋骨間寒熱
溼痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風
頭痛腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人光
澤脂緻
疏○蔓荆實稟陽氣以生兼得金化而成神
農味苦微寒無毒別錄加辛平溫察其功用

滯若溫能通行散邪則胃氣利而寒熱自除欬逆亦邪氣壅胃所致邪散氣下則欬逆自止矣

主治參互

外臺秘要頭風痛取荆瀝不拘多少服日日服之　朱震亨治心痛及婦人白帶用牡荆實炒焦爲末飲服　入折傷藥能散瘀血和筋骨

證悉除矣邪去則九竅自通痹散則光澤脂
致其主堅齒者齒雖屬腎而牀屬陽明陽明
客風熱則上攻牙齒爲動搖腫痛散陽明之
風熱則齒自堅矣去白蟲長蟲者假其苦辛
之味耳益氣輕身耐老必非風藥所能也
主治參互
同甘菊花荊芥酒炒黃芩烏梅芽茶白蒺藜
川芎羌活黑豆土茯苓治偏頭風痛目將損

應是苦溫辛散之性而寒則甚少也氣清味
薄浮而升陽也入足太陽足厥陰兼入足陽
明經其主筋骨間寒熱溼痺拘攣風頭痛腦
鳴目淚出者蓋以六淫之邪風則傷筋寒則
傷骨而爲寒熱甚則或成溼痺或爲拘攣又
足太陽之脉夾脊循項而絡於腦目爲厥陰
開竅之位邪傷二經則頭痛腦鳴目淚出此
藥味辛氣溫入二臟而散風寒溼之邪則諸

用之去心及外毛毛射人肺令人欬

疏○辛夷稟春陽之氣以生故其味辛氣溫性無毒氣淸而香味薄而散浮而升陽也入手太陰足陽明經其主五臟身體寒熱風頭腦痛面䵟解肌通鼻塞涕出面腫引齒痛者皆二經受風邪所致足陽明主肌肉手太陰主皮毛風邪之中人必自皮毛肌肉以達於五臟而變為寒熱又鼻為肺之竅頭為諸陽

者

簡誤

頭目痛不因風邪而由於血虛有火者忌之

元素云胃虛人不可服恐生痰疾

辛夷味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面䵟溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老可作膏藥

所能雖出自神農本經然而易世相傳得無
謬訛存而不論可也
主治叅互
同甘菊花蒼耳子薄荷細辛甘草羌活藁本
防風川芎治風寒入腦頭痛或鼻塞流涕或
鼻淵涕下不止腥臭
簡誤
辛香走竄之性氣虛人不宜服雖偶感風寒

之首三陽之脉會於頭面風客陽分則爲頭
痛面鼾鼻塞涕出面腫引齒痛辛溫能解肌
散表芳香能上竄頭目逐陽分之風邪則諸
證自愈矣眩冒及身兀兀如在車船之上者
風主搖動之象故也風邪散中氣溫則九竅
通矣大風之中人則毛髮脫落風淫之浸淫
則腸胃生蟲散風行淫則鬚髮生而蟲自去
矣久服下氣輕身明目增年耐老悉非風藥

於桑抽其精英故功用比桑尤勝腰痛及小
兒背强皆血不足之候癰腫多由於榮氣熱
肌膚不充由於血虛齒者骨之餘也髮者血
之餘也益血則髮華腎氣足則齒堅而鬚眉
長血盛則胎自安女子崩中及內傷不足皆
血虛內熱之故產後餘疾皆由血分乳汁不
下亦由血虛金瘡則全傷於血上來種種疾
病莫不悉由血虛有熱所發此藥性能益血

鼻竅不通亦不得用頭腦痛屬血虛火熾者

不宜用齒痛屬胃火者不宜用

桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背强癰

腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女

子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁其實主明

目輕身通神

疏○桑寄生感桑之精氣而生其味苦甘其

氣平和不寒不熱固應無毒詳其主治一本

杜仲味辛甘平無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨强志除陰下癢溼小便餘瀝脚中酸痛不欲踐地久服輕身耐老

疏◎杜仲禀陽氣之微得金氣之厚故其味辛氣平無毒別錄加甘溫甄權言苦煖應是辛甘勝而苦次之溫煖多而平爲劣也氣薄味厚陽中陰也入足少陰兼入足厥陰經按本經所主腰脊痛益精氣堅筋骨脚中酸痛

故竝主之也兼能祛溼故亦療痹　實味甘

平亦益血之藥故主治如經所云也

主治參互

同枸杞子地黃胡麻川續斷何首烏當歸牛

膝治血虛手臂骨節疼痛　入獨活寄生湯

療一切風溼痹　聖惠方療胎動腹痛桑寄

生一兩五錢阿膠炒五錢艾葉五錢水一盞

半煎一盞去滓溫服或去艾葉以其熱也

足故久服能輕身耐老其主補中者肝腎在
下臟中之陰也陰足則中亦補矣

主治參互

同牛膝枸杞子續斷白膠地黃五味子兎絲
子黃蘗山藥治腎虛腰痛及下部軟弱無力

崔元亮海上方治腎虛腰痛用杜仲去皮
酥炙黃一斤分作十劑每夜取一劑以水一
升浸至五更煎三分減一取汁去滓以羊腎

不欲踐地者蓋腰爲腎之府經日動搖不能
腎將憊矣又腎藏精而主骨肝藏血而主筋
二經虛則腰脊痛而精氣乏筋骨軟而脚不
能踐地也五臟苦欲補瀉云腎苦燥急食辛
以潤之肝苦急急食甘以緩之杜仲辛甘具
足正能解肝腎之所苦而補其不足者也强
志者腎藏志益腎故也除陰下癢溼小便餘
瀝者祛腎家之溼熱也益腎補肝則精血自

末作糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

青娥丸見補骨脂條下

簡誤

腎虛火熾者不宜用即用當與黃蘗知母同

入

楓香脂味辛苦平無毒主癮疹風癢浮腫齒痛

一名白膠香附李時珍治一切癰疽瘡疥金瘡吐血咯血活血生肌止痛解毒燒過揩牙永無牙疾

三四枚切片放下再煎三五沸如作羹法和
以椒鹽空腹頓服　得效方治風冷傷腎腰
背虛痛杜仲一斤切炒酒二升漬十日日服
三合　肘後方治病後虛汗及目中流淚杜
仲牡蠣等分爲末臥時水服五七不止更服
　簡便方治頻慣墮胎或三四月卽墮者於
兩月前以杜仲八兩糯米煎湯浸透炒去絲
續斷二兩酒浸焙乾爲末以山藥五六兩爲

袖珍方治便癰膿血白膠香一兩爲末入麝香輕粉少許摻之　直指方諸瘡不合白膠香輕粉各二錢猪脂和塗　儒門事親一切惡瘡水沉金絲膏用白膠香瀝青各一兩以麻油黃蠟各二錢同溶化入冷水中扯千遍攤貼之　危氏得效方年久牙疼楓香脂爲末以香爐內灰和勻每旦揩擦

楓香近世爲外科要藥除外科無別用故不

疏○楓香脂屬金有火故其味辛苦氣平無毒氣薄味厚陽中之陰也入足厥陰爲活血凉血之藥凡熱則生風又血熱則壅而發癮瘮風爲木化風火相搏則爲浮腫苦平能凉血熱兼辛又能散風故主血熱生風之證風火既散則肌肉和而浮腫自消齒痛亦因風熱上攻風熱既散則痛亦止矣

主治參互

雖無病而亦不安百疾叢生矣經曰精不足
者補之以味蓋腎本寒因虛則熱而軟此藥
氣味俱陰正入腎除熱補精之要品腎得補
則五臟自安精神自足百疾去而身肥健矣
其主補中者以其味甘甘爲土化故能補中
也所主如上功能則輕身不老蓋有自矣此
藥有變白明目之功累試輒驗而經文不載
爲闕畧也葉長子黑色者爲女貞葉微圓子

著簡誤

女貞實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老

疏○女貞實稟天地至陰之氣故其木淩冬不凋神農味苦氣平別錄加甘無毒觀今人用以爲變白多效者應是甘寒凉血益血之藥氣薄味厚陰中之陰降也入足少陰經夫足少陰爲藏精之臟人身之根本虛則五臓

兩旱蓮草五月收陰乾十兩爲末桑椹子四月收陰乾十兩爲末煉蜜丸如梧子大每服七八十丸淡鹽湯下若四月收桑椹搗汁和藥七月收旱蓮搗汁和藥卽減蜜之半矣濟急僊方治風熱赤眼冬青子不拘多少搗汁重湯熬膏淨瓶收固每用點眼　普濟方治一切眼疾冬青葉研爛入朴硝貼之海上方也

紅色者爲凍青亦能治風虚補益肌膚

主治叅互

同地黃何首烏人參麥門冬旱蓮草南燭子牛膝枸杞子山藥沒食子桑椹子黃櫱椒紅蓮鬚爲變白要藥　同甘菊花生地黃蒺藜枸杞子能明月　簡便方治虚損百病久服鬚白再黑返老還童用女貞實十月上巳日收陰乾用時以酒浸一日蒸透曬乾一斤四

藏血之臟血虛則發熱熱甚則生風苦寒能
涼血清熱故主之也其補腰膝令徤者腰爲
腎之府腎虛則溼熱乘之而腰膝不利又腎
爲作强之官虛則熱而軟故其性欲堅急食
苦以堅之此藥味苦入腎正遂其欲堅之性
耳腎氣既實則溼熱自除而腰膝自徤矣

主治參互

秘方取其葉煑飲治痰火甚驗葢痰火未有

簡誤

氣味俱陰變白家當維保脾胃藥及椒紅溫煖之類同施不則恐有腹痛作泄之患

○枸骨本經附出女貞條下不載氣味所主然觀陳藏器云其皮堪浸酒補腰膝令徤枝葉燒灰淋汁或煎膏塗白癜風亦可作稠煎傅之應是苦寒無毒氣味俱陰入肝入腎之藥也惟其入肝故主白癜風蓋肝爲風木之位

脾胃虛寒作泄及火衰陰痿者忌之

蕤核味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫眥爛齆鼻破心下結痰痞氣久服輕身耐老不饑

疏○蕤核得土氣以生神農味甘氣溫別錄加微寒無毒氣薄味厚陽中之陰也入足厥陰經厥陰爲風木之臟開竅於目風熱乘肝則肝血虛而目爲之病或爲赤痛腫傷或爲

不因陰虛火炎上爍乎肺煎熬津液而成此
藥直入足少陰經補養陰氣則痰火自消如
釜底抽薪之意也兼能散風毒惡瘡昔有老
妓患楊梅結毒三十年者有道人教以單服
此藥瘡愈而顏色轉少皆假其清熱凉血之
功耳一名樞木黑子者名極木又名猫兒刺
用作羅經入地不差

簡誤

主治參互

和劑局方春雪膏治肝虛風熱上攻眼目昏暗癢痛隱澀赤腫羞明迎風有淚多見黑花用蕤核去皮壓去油二兩腦子二錢半研勻生蜜六錢和收點眼　集效方百點膏治一切風熱眼蕤仁去油三錢甘草防風各六錢黃連五錢以三味煎取濃汁次下蕤仁膏日點

淚出眥爛此藥溫能散風寒能除熱甘能補血肝氣和而目疾悉瘳矣其主心腹邪結氣者即邪熱氣也熱則生痰痰礙中焦氣爲之痞甘寒除熱溫主通行熱邪去而痰自不生痰結解而氣自通暢矣鼻齆者熱在上焦心肺之分也甘寒總能除上下之熱故亦主之非養性益精之藥而云輕身益氣不饑者未必然也

明經其主溫脾胃止霍亂擁脹者蓋脾胃爲
倉廩之官飲食生冷傷於脾胃畱而不去則
爲壅塞脹滿上湧下泄則爲揮霍撩亂辛溫
煖脾胃而行滯氣則霍亂止而擁脹消矣齒
痈䘌者亦陽明溼熱上攻也散陽明之邪則
痈䘌自除療風毒諸腫者辛溫散結而香氣
又能走竅除穢濁也

主治条互

簡誤

目病非關風熱、而因於肝腎兩虚者不宜用

凡脩事湯浸去皮尖劈作兩片用芒硝木通

通草同煎一伏時取出研膏入藥

丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒

諸腫齒疳䘌能發諸香

疏〇丁香稟純陽之氣以生故其味辛氣溫

性無毒氣厚味薄升也陽也入足太陰足陽

丸黍米大量大小用薑湯下　和劑局方治婦人產難母丁香乳香麝香三件用十分之三各爲末臘月兎腦和杵爲丸如芡實大每服一丸酒下　梅師方治乳頭破裂丁香末傅之　證治要訣食蟹致傷丁香末薑湯服五分　入陳氏異攻散治痘瘡虛寒之極又値冬月寒氣薄之發不出者

簡誤

同白豆蔻藿香陳皮厚朴砂仁治霍亂因於
寒加生薑半夏治吐嘔因於寒冷傷胃或寒
月飽食受寒腹痛甚　同砂仁厚朴乾薑橘
皮草果蒼朮木香麥蘖治小兒傷生冷腹痛
　劉氏小兒方治小兒虛寒吐瀉丁香橘皮
等分薑汁糊丸菉豆大米湯化下　全幼心
鑑治小兒脾胃虛寒嘔吐不止丁香半夏末
各一錢薑汁浸一夜曬乾爲末薑汁打麪爲

諸毒沉香得雨露之精氣故能解風火之毒水腫者脾溼也脾惡溼而喜燥辛香入脾而燥溼則水腫自消凡邪惡氣之中人必從口鼻而入口鼻爲陽明之竅陽明虛則惡氣易入得芬芳清陽之氣則惡氣除而脾胃安矣附錄李珣味苦溫無毒主心腹痛霍亂中惡邪鬼疰清人神竝宜酒煑服之諸瘡腫宜入膏用日華子味辛熱無毒主調中補五藏益

丁香氣味辛溫一切有火熱證者忌之非屬
虛寒槩勿施用
沉香微溫療風水毒腫去惡氣
疏○沉香稟陽氣以生兼得雨露之精氣而
結故其氣芬芳其味辛而無毒氣厚味薄可
升可降陽也入足陽明太陰少陰兼入手少
陰足厥陰經本經療風水毒腫者卽風毒水
腫也風爲陽邪鬱於經絡遇火相煽則發出

胸中氣結或氣逆不快　醫壘元戎治胞轉不通非小腸膀胱厥陰受病乃强忍房事或過忍小便所致當治其氣則愈非利藥可通也沉香木香各二錢爲末白湯空腹服之以通爲度

簡誤

沉香治冷氣逆氣氣鬱氣結殊爲要藥然而中氣虛氣不歸元者忌之心經有實邪者忌

精壯陽煖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破
痃癖冷風痲痺骨節不任風溼皮膚瘙心腹
痛氣痢元素補右腎命門相火

主治參互

同人參菖蒲遠志茯神酸棗仁生地黃麥門
冬治思慮傷心心氣鬱結不舒者　得木香
藿香砂仁治中惡腹中㽲痛辟一切惡氣
同蘇子橘紅枇杷葉白豆蔻人參麥門冬治

乳香微溫療風水毒腫去惡氣療風癮癣癢毒

疏○乳香得木氣而兼火化本經微溫大明辛熱微毒元素苦辛氣厚味薄陽也入足太陰手少陰兼入足厥陰經風水毒腫邪干心脾惡氣內侵亦由二經虛而邪易犯癮癣癢毒總因心脾爲風溼熱邪所干致之脾主肌肉而痛癢瘡瘍皆屬心火此藥正入二經辛香能散一切留結則諸證自瘳矣日華子云

之非命門眞火衰者不宜入下焦藥用

檀香

本經無正文弘景云白檀消熱腫藏器主心腹霍亂中惡鬼氣殺蟲日華子云檀香熱無毒治心痛霍亂腎氣腹痛濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處詳其所主諸證亦是芬芳開發辟惡散結除冷之藥也今人多供燃爇非上乘沉水者不入藥

膝澤蘭黑豆蒲黃五靈脂延胡索牡丹皮山
查治產後兒枕作痛　入一切膏藥能消毒
止痛　靈苑方治甲疽努肉膿血疼痛不愈
用乳香爲末膽礬燒研等分傅之内消即愈
　山居四要治玉莖作腫乳香葱白等分擣
敷　簡要濟衆方難產催生用明乳乳香爲末
取母猪血和丸梧子大每服五丸酒下
簡誤

煎膏止痛長肉陳藏器云治婦人血氣療諸
瘡令內消則令人用以治內傷諸痛及腫毒
內服外敷之藥有自來矣

主治条互

同紫花地丁白及白歛金銀花夏枯草白芷
連翹貝母甘菊甘草穿山甲沒藥治一切癰
疽疔腫　同續斷牛膝當歸紅麯牡丹皮沒
藥地黃川芎治內傷胸脇作痛　同沒藥牛

名醫錄云周崇被海寇刃傷血出不止筋骨如斷用花蕋石散不效軍士李高用紫金散掩之血止痛定明日結痂如鐵遂愈且無瘢痕叩其方則用紫藤香蕣丸刮下研末爾云即降眞之最佳者曾救萬人

蘇合香味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年痓作痙

癰疽已潰不宜服諸瘡膿多時未宜遽用

降眞香李珣云味辛溫無毒燒之辟天行時氣宅舍怪異小兒帶之辟邪惡氣

疏○降眞香香中之清烈者也故能辟一切惡氣不祥入藥以番舶來者色較紅香氣甜而不辣用之入藥殊勝色深紫者不良上部傷瘀血停積胸膈骨按之痛或并脇肋痛此吐血候也急以此藥刮末入藥煎服之良治內傷或怒氣傷肝吐血用此以代鬱金神效

手陽明兼入足少陰經十劑云澀可去脫脾
虛滑洩不禁非澀劑無以固之膀胱虛寒則
小便不禁腎與膀胱爲表裏腎虛則精滑時
從小便出此藥氣溫味酸澀入三經而收歛
虛脫之氣故能主諸證也精固則精氣日生
而陽氣充骨髓滿故耐寒輕身也

主治參互

和芡實粉爲丸名水陸丹益氣補眞　孫眞

疏○蘇合香聚諸香之氣而成故其味甘氣
溫無毒凡香氣皆能辟邪惡況合衆香之氣
而成一物者乎其走竄逐邪通神明殺精鬼
除魘夢溫瘧蠱毒宜然矣亦能開鬱
金櫻子味酸濇平溫無毒療脾泄下痢止小便
利濇精氣久服令人耐寒輕身
疏○金櫻子得陽氣而兼木化故其味酸濇
氣平溫無毒氣薄味厚陰中陽也入足太陽

變白不老浸酒服之生溫括睦婺山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以爲名

疏○放杖木得土氣以生故味甘氣溫無毒甘入脾而養血溫散風而通行故主一切風血腰脚爲病變白易老亦皆血虛不能榮養筋骨及潤毛髮所致甘能補血血足則髮自不白身輕不老有自來矣

人食忌金櫻子煎霜後用竹夾子摘取入木

臼中杵去刺劈去核以水洗過擣爛入大鍋

水煎不得絕火減半濾過仍煎似稀餳每服

一匙煖酒調服活血駐顏其功不可備述

簡誤

泄瀉由於火熱暴注者不宜用小便不禁及

精氣滑脫因於陰虛火熾而得者不宜用

放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身

神農本草經疏卷之十三

木部中品

總九十二種今疏其要者二十六種

桑根白皮 葉耳椹灰枝黃附　竹葉 茹瀝附

吳茱萸　檳榔　梔子

騏驎竭　龍腦香　蕪荑

枳殼　枳實　厚朴

茗苦搽　山茱萸　紫葳

神農本草經疏卷之十二

疏○桑根白皮得土金之氣故味甘氣寒而
無毒東垣海藏俱云兼辛然甘厚辛薄降多
升少陽中陰也入手太陰經甘以固元氣而
補不足辛以瀉肺邪之有餘故能止嗽也凡
肺中有水氣及肺火有餘者宜之傷中者中
氣傷也五勞者五臟勞傷也六極者六腑之
中氣極也羸瘦者肌肉脫也崩中者血脫也
脉絕者氣血兩虛之至故脉不來也之數者

胡桐淚　　猪苓　　烏藥

沒藥　　安息香　　仙人杖

海桐皮　　大腹　　合歡

五倍子　　天竺黃　　蜜蒙花

桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絶補虚益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡出土上者殺人

道除溼補虛之功也溼熱盛則寸白生消除溼熱則蟲自不能畱也縫金瘡者甘寒補益宜於傷損也

主治參互

得天麥二冬、款冬花百部薄荷甘草沙參貝母枇杷葉五味子爲治嗽要藥　得芍藥薏苡仁木瓜茯苓橘皮赤小豆爲治水腫之神劑　經驗方治咳嗽吐血甚者鮮桑根白皮

皆由陰不足則陽有餘陽有餘則火盛而內
熱火與元氣不兩立火能消物造化自然也
惟甘也可以補元氣惟寒也可以除內熱熱
除矣元氣生矣則上來諸證自瘳故本經終
之以補虛益氣焉別錄去肺中水氣者即十
劑中云燥可去溼桑白皮之屬是巳吐血熱
渴者熱傷肺火炎迫血妄行溢出上竅而兼
發熱作渴也其主水腫腹滿臚脹者即利水

皮煑汁塗乳上飲之　聖惠方治小兒流涎
脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自然汁飲
之甚效煎飲亦良　聖惠方治小兒天吊驚
癎取家桑東行根研汁服　千金方治石癰
堅硬不作膿者桑白皮陰乾爲末烊膠和酒
調傅以軟爲度　蘇頌取皮中白汁主治小
兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又塗金刃所傷
燥痛須臾血止仍以白皮裹之甚良　時珍

一斤米泔浸三宿刮去黄皮剉細入糯米四
兩焙乾爲末每服一錢米飲下　肘後方治
消渴尿多入地三尺桑根剝取白皮炙黄黑
剉以水煮濃汁隨意飲之亦可少入米勿用
鹽　肘後方治産後下血炙桑白皮煮水飲
之　經驗方治墜馬拗損桑根白皮五斤爲
末以水五升煎膏敷之便止已後亦無宿血
終不發動　子母秘方治小兒重舌桑根白

疏○葉本經無氣味詳其主治應是味甘氣寒性無毒甘所以益血寒所以凉血甘寒相合故下氣而益陰是以能主陰虛寒熱及因內熱出汗其性兼燥故又能除脚氣水腫利大小腸原稟金氣故又能除風經霜則兼得天地之清肅故又能明目而止渴髮者血之餘也益血故又能長髮凉血故又止吐血血合癰口罨穿掌瘡湯火皆清凉補血之功也

取汁塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗　取枝燒瀝治大風瘡疥生眉髮　子母秘錄治小兒鵝口桑皮汁和胡粉塗之　聖惠方治小兒唇腫桑木汁塗之卽愈　摘玄方治破傷中風桑瀝好酒對和溫服以醉爲度醒服消風散

簡誤

肺虛無火因寒襲之而發咳嗽者勿服

○桑葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

內煎減二分傾出澄清溫熱洗目至百度屢
試有驗正月初八二月初八三月初六四月
初四五月初六六月初二七月初七八月二
十九九月十二十月十三十一月初二十二
月三十　集簡方治風眼下淚臘月不落桑
葉煎湯日日溫洗或入芒硝　千金方治頭
髮不長用桑葉麻葉煮泔水沐之七日可長
數尺　聖濟總錄治吐血不止晩桑葉焙乾

主治參互

四月採桑葉酒拌九蒸九曝爲末胡麻或黑芝麻去殼九蒸九曝另磨如泥各等分煉蜜和爲丸每五六錢空心饑時白湯下能益氣血袪風仙家餌之爲引年止饑之要藥　普濟方治青盲洗法昔武勝軍宋仲孚患此二十年用此法二年目明如故摘青桑葉曬乾逐月按日就地上燒存性每以一合於甆器

者治癖飲積聚腹痛金瘡　桑耳煅存性研細香附童便炒黑研細每用桑耳灰二分香附末三分淡醋湯空心調服治血崩奇效過於他木耳

○桑椹味甘寒無毒單食止消渴陳藏器利五藏關節通血氣久服不饑安魂鎮神令人聰明變白不老多收暴乾爲末蜜丸日服時珍搗汁飲解中酒毒釀酒服利水氣消腫一名文武

研凉茶服三錢只一服止後用補肝肺藥

直指方治癰口不歛經霜黃桑葉爲末傅之

通玄論治穿掌腫毒新桑葉研爛罨之卽

愈　醫學正傳治湯火傷瘡經霜桑葉燒存

性爲末油和敷之三日愈

○桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白沃血

病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不

調其黃熟陳白者止久泄益氣不饑其金色

神自清寧神清則聰明內發陰復則變白不
老甘寒除熱故解中酒毒性寒而下行利水
故利水氣而消腫皆自然之道也

主治參互

寇宗奭曰本經言桑甚詳獨遺烏椹然桑之
精英盡在於此採摘微研以布濾汁石器熬
成稀膏量入多少蜜熬稠貯甆器中每抄一
二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石藥發

實

疏○桑椹者桑之精華所結也其味甘其氣寒其色初丹後紫味厚於氣合而論之甘寒益血而除熱其爲凉血補血益陰之藥無疑矣消渴由於內熱津液不足生津故止渴五臟皆屬陰益陰故利五臟陰不足則關節之血氣不通血生津滿陰氣長盛則不饑而血氣自通矣熱退陰生則肝心無火故魂安而

皮切以水二斗煮汁一斗入桑椹再煮取五
升以糯米飯五升釀酒飲　保命集治瘰癧
結核文武膏用文武實卽桑椹子二斗黑熟
者以布取汁銀石器熬成膏每白湯調服一
匙日三服　千金方治小兒赤禿桑椹子取
汁頻服　聖濟錄治小兒白禿黑椹入罌中
曝三七日化爲水洗之三七日神效　集簡
方治陰證腹痛桑椹絹包風乾過伏天爲細

熱口渴生精神及小腸熱甚　僊方日乾爲末蜜和丸酒服亦良　四時月令云四月宜飲桑椹酒能理百種風熱其法用桑椹汁三斗重湯煑至一斗半入白蜜二合酥油一兩生薑汁一合煑令得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒藏之經年味愈佳

普濟方治水腫脹滿水不下則滿溢水下則虛竭還脹十無一活宜用桑椹酒治之桑白

煑乾別名木礆能鑽筋透骨爲傅癰疽拔疔

引諸散毒藥攻毒之要品　得丹砂雄黃乳

香沒藥牛黃龍腦香紅白藥子白及白歛傅

一切腫毒止痛追毒有奇效　得鐵鏽蟾酥

可拔疔

○枝味苦平性不冷不熱主遍體風癢乾燥火

氣脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣欬嗽

消食利小便療癰疽後渴嫩條細搗一升熬

末每服三錢熱酒下取汗

簡誤

甘寒帶滑故潤而下行脾胃虛寒作泄者勿

服

○桑柴灰味辛寒有小毒淋取汁與冬灰等分

同滅痣疵黑子蝕惡肉煑赤小豆食大下水

脹傅金瘡止血生肌　桑霜卽灰汁以桑皮

綿紙襯淘籮底用滾水淋下甆器盛之重湯

疏○竹葉稟陰氣以生本經味辛平氣大寒無毒甄權言甘寒氣薄味厚陰中微陽降也入足陽明手少陰經陽明客熱則胸中生痰痰熱壅滯則欬逆上氣辛寒能解陽明之熱結則痰自消氣自下而欬逆止矣仲景治傷寒發熱大渴有竹葉石膏湯無非假其辛寒散陽明之邪熱也

主治參互

香煎飲亦無禁忌久服終身不患偏風　聖
惠方治紫白癜風桑枝十斤益母草三斤水
五斗慢煑至五升去滓再煎成膏每臥時溫
酒調服半合以愈爲度
○桑黃氣味與白皮同其除肺熱之功殆又過
之山家老桑樹多生湖桑少見　同天門冬
百部山梔枇杷葉治赤鼻有神
竹葉味辛平大寒無毒主胸中痰熱欬逆上氣

疏○竹茹雖與竹葉同本然竹茹得土氣多故味帶甘氣微寒無毒入足陽明經經曰諸嘔吐酸水皆屬於熱陽明有熱則爲嘔啘溫氣寒熱亦邪客陽明所致甘寒解陽明之熱則邪氣退而嘔啘止矣甘寒又能凉血清熱故主吐血崩中及女勞復也

主治參互

同木瓜橘皮麥門冬枇杷葉人參蘆根汁石

煎湯調酸棗仁炒熟末五錢臨臥服治心虛
不得眠　同麥門冬酸棗仁遠志丹參茯神
丹砂犀角治心經蘊熱虛煩不眠　入白虎
湯治傷寒煩熱大渴引飲　肘後方治時行
發黄竹葉五升小麥七升石膏三兩水一斗
半煑取七升細服盡劑愈
○淡竹茹味甘微寒無毒主嘔啘溫氣寒熱吐
血崩中

○淡竹瀝味甘大寒無毒療暴中風痺胸中大
熱止煩悶消渴勞復
疏○竹瀝竹之津液也經云大寒亦言其本
性耳得火之後寒氣應減性滑流利走竅逐
痰故爲中風家要藥凡中風之證莫不由於
陰虛火旺煎熬津液結而爲痰壅塞氣道不
得升降熱極生風以致猝然僵仆或偏痺不
仁此藥能遍走經絡搜剔一切痰結兼之甘

斛治胃虛有熱嘔啘不止　活人書治傷寒

愈後交接女勞復頭痛身熱耳鳴口渴腰骨

痛男子卵腫股痛竹皮一升水三升煑五沸

服汁　又方治婦人大病初愈有所動勞致

熱氣衝胸手足搐搦拘急如中風狀淡竹青

茹半斤栝樓二兩水二升煎一升分二服

簡誤

胃寒嘔吐及感寒挾食作吐忌用

金童便麥門冬治似中風口眼喎斜語言蹇
澀或半身不遂等證　千金方治中風口噤
竹瀝加薑汁日日飲之　梅師方治產後中
風口噤身直面青手足反張以竹瀝飲一二
升即甦　外臺秘要治破傷中風凡閃脫折
骨諸瘡慎不可當風用扇中風則發痙口噤
項急殺人亟飲竹瀝二三升忌飲食及酒
千金方小兒傷寒淡竹瀝葛根汁各六合細

寒能益陰而除熱痰熱旣祛則氣道通利經
脉流轉外證自除矣其主胸中大熱止煩悶
者取其甘寒清熱益陰之功耳觀古人以竹
瀝治中風則知中風未有不因陰虛痰熱所
致不然如果外來風邪安得復用此甘寒滑
利之藥治之哉

主治參互

同貝母栝樓仁霞天膏白芥子蘇子橘紅鬱

之日三五次以愈爲度

簡誤

寒痰溼痰及飲食生痰不宜用

吳茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛欬逆寒熱除溼血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏

疏○吳茱萸稟火氣以生故其味辛氣溫有小毒甄權辛苦大熱氣味俱厚陽也入足陽

細與服　至寶方小兒狂語夜後便發竹瀝
夜服二合　產寶方婦人胎動妊娠因夫所
動困絕以竹瀝飲一升立愈　梅師方孕婦
子煩茯苓二兩竹瀝一升水四升煎二升分
三服　千金方時氣煩躁五六日不解青竹
瀝半盞煎熱數數飲之覆取微汗　李絳兵
部手集䖍欬嗽肺痿大人小兒欬逆短氣胸中
吸吸欬出涕唾嗽出臭膿用淡竹瀝一合服

邪從腠理而出中惡腹痛亦邪惡之氣干犯
脾胃所致入脾散邪則腹痛自止矣

主治叅互

仲景吳茱萸湯治少陰病吐利手足逆冷煩
躁欲死者吳茱萸一斤人參二兩生薑六兩
大棗十二枚劈四味以水七升煑二升去滓
溫服七合日三服厥陰乾嘔吐涎沫頭痛者
同此方　又當歸四逆加吳茱萸湯治厥陰

明太陰兼入足少陰厥陰經凡脾胃之氣喜
溫而惡寒寒則中氣不能運化或爲冷實不
消或爲腹內絞痛或寒痰停積以致氣逆發
欬五臟不利辛溫煖脾胃而散寒邪則中自
溫氣自下而諸證悉除其主除溼血痺逐風
邪者蓋以風寒溼之邪多從脾胃而入脾胃
主肌肉爲邪所侵則腠理閉密而寒熱諸痺
所從來矣辛溫走散開發故能使風寒溼之

有效　肘後方治寒疝往來吴茱萸一兩生
薑半兩清酒一升煎分溫服　聖惠方治食
已吞酸胃虛冷者吴茱萸湯泡七次焙乾薑
等分爲末湯服一錢　孫氏存仁方治多年
脾泄老人多此謂之水土同化吴茱萸三錢
泡入水煎汁入鹽少許通口服蓋茱萸能煖
膀胱水道既清大腸自固他藥雖熱不能分
解清濁也　和劑局方戊巳丸治脾胃受溼

證手足厥冷脉細欲絕其人內有久寒者當歸三兩芍藥三兩炙甘草二兩通草二兩桂枝三兩細辛三兩生薑半斤吳茱萸二升大棗二十五枚以水六升清酒六升同煑取五升去滓分五服　食療治冬月感寒吳茱萸五錢煎湯服之取汗　聖惠方治陰毒傷寒四肢逆冷用吳茱萸一升酒拌溼絹袋二箇包蒸極熱更互熨足心候氣透痛亦即止累

火者不宜用欬逆上氣非風寒外邪及冷痰宿水所致不宜用腹痛屬血虛有火者不宜用赤白下痢病名滯下因暑邪入於腸胃而非酒食生冷停滯積垢者不宜用小腸疝氣非驟感寒邪及初發一二次者不宜用霍亂轉筋由於脾胃虛弱冒暑所致而非寒溼生冷干犯腸胃者不宜用一切陰虛之證及五臟六腑有熱無寒之人法所咸忌

下痢赤白腹痛米穀不化用吳茱萸黃連白
芍藥各一兩同炒爲末蒸餅丸梧子大每服
二三十丸米飲下

箇誤

陽厥似陰手足雖逆冷而口多渴喜飲水大
小便秘結小便或通亦赤澀短少此火極似
水守眞所謂禁慄如喪神守皆屬於火之謂
耳此與桂附乾薑之類同忌嘔吐吞酸屬胃

溼熱停久則變生諸蟲此藥辛能散結破滯
若能下泄殺蟲故主如上諸證也甄權宣利
五臟六腑壅滯破胸中氣下水腫治心痛積
聚日華子下一切氣通關節利九竅健脾調
中破癥結李珣主賁豚氣五膈氣風冷氣脚
氣宿食不消皆取其辛溫走散破氣墜積能
下腸胃有形之物耳

主治參互

檳榔味辛溫無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲
伏尸療寸白

疏○檳榔得天之陽氣地之金味故味辛氣溫無毒大明言澀元素言苦以其感盛夏之火氣耳氣薄味厚陽中微陰降也入手足陽明經夫足陽明爲水穀之海手陽明爲傳道之官二經相爲貫輸以運化精微者也二經病則水穀不能以時消化羈留而成痰癖或

痛雜心檳榔高良薑各一錢半陳米百粒同以水煎服之　廣利方脚氣衝心悶亂不識人用白檳榔十二分爲末分二服空心煖小便調下日二服　十便良方蟲痔裏急檳榔爲末每日空心以白湯調二錢　千金方寸白蟲病檳榔二七枚爲末先以水二升半煑檳榔片取一升空心調末方寸匕服之經日蟲盡出未盡再服以盡爲度

同草果枳實橘皮治食瘧加三稜蓬茂礬紅
紅麴山查麥蘖消一切堅硬肉食及諸米麪
生冷食積成塊作痛　同黃連藊豆蓮肉橘
紅白芍藥紅麴烏梅葛根枳殼治滯下後重
　同雷丸使君子白蕪荑蘆薈肉豆蔻胡黃
連治小兒疳蚘　同楝根鶴蝨錫灰薏苡根
貫衆烏梅治一切寸白蟲　同蒼朮草果青
皮甘草治山嵐瘴氣發瘧　直指方心脾作

面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛胸

心大小腸大熱心中煩悶

疏○梔子感天之清氣得地之苦味故其性

無毒氣薄而味厚氣浮而味沉陽中陰也入

手太陰手少陰足陽明經少陰爲君主之官

邪熱客之則五臟皆失所主清少陰之熱則

五內邪氣自去胃中熱氣亦除面赤酒皰皶

鼻者肺熱之候也肺主清肅酒熱客之即見

簡誤

檳榔性能墜諸氣至於下極病屬氣虛者忌之脾胃虛雖有積滯者不宜用下利非後重者不宜用心腹痛無蟲結及非蟲攻咬者不宜用瘧非山嵐瘴氣者不宜用凡病屬陰陽兩虛中氣不足而非腸胃壅滯宿食脹滿者悉在所忌

梔子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣

懊憹者有梔子豉湯用梔子十四枚香豉四合水煎服　入茵陳大黃湯治傷寒溼熱發黃腹脹梔子十四枚茵陳六兩大黃三兩水一斗先煑茵陳減六升內二味煑取三升分三服小便當利尿如皂角汁狀正赤一宿腹減黃從小便出也　同甘草黃蘗爲梔子蘗皮湯亦治發黃身熱　同厚朴枳實爲梔子厚朴湯治傷寒下後心煩腹滿臥起不安者

是證於開竅之所延及於面也肺得苦寒之氣則酒熱自除而面鼻赤色皆退矣其主赤白癩瘡瘍者即諸痛痒瘡瘍皆屬心火之謂療目赤熱痛及胸心大小腸大熱心中煩悶者總除心肺二經之火熱也此藥味苦氣寒瀉一切有餘之火故能主如上諸證

主治叅互

仲景治傷寒汗吐下後虛煩不得眠及心中

接後發動欲死不能語者梔子三十枚水三升煎一升服令微汗　救急方治湯盪火傷梔子末和雞子清濃塗之　丹溪方治胃脘火痛山梔七枚炒水一盞煎七分入生薑汁飲之立止

簡誤

梔子稟至苦大寒之氣苦寒損胃而傷血凡脾胃虛弱者忌之血虛發熱者忌之性能瀉

得吐即愈　同鼠矢作湯治大病後勞復小
便不利者小便利即愈已上皆仲景法　同
連翹麥門冬竹葉燈心草生甘草黃連能瀉
心經有餘之火加赤茯苓木通滑石澤瀉瀉
小腸火　同桑黃或桑白皮黃芩甘草桔梗
五味子乾葛治酒熱傷肺發出鼻皶　同茵
陳蒿滑石車前子秦艽黃連連錢草茸蓿治
酒熱發黃　梅師方治熱病後勞復及因交

氣而行氣降則火降火降則血自歸經不求
其止而止矣此治療之要法不可違也
騏驎竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止
痛破積血金瘡生肉舊與紫鉚同條今分出
疏○騏驎竭禀土氣而兼水化故味甘鹹氣
平無毒丹房鑑源云禀於熒惑之氣生於湯
石之陰其色赤象火而味鹹則得陰氣也氣
薄味厚陰也降也入足厥陰手少陰經甘主

有餘之火心肺無邪熱者不宜用小便不通由於膀胱虛無氣以化而非熱結小腸者不宜用癃瘍因氣血虛不能收斂則爲久冷敗瘡非溫煖補益之劑則不愈此所謂旣潰之後一毫寒藥不可用是也世人又以治諸血證不知血得熱則行得寒則凝瘀血凝結於中則反致寒熱或發熱勞嗽飲食減少爲難療之病凡治吐血法當以順氣爲先蓋血隨

䗪蟲黃荊子骨碎補治一切打撲損傷　同
髮灰乳香沒藥片腦輕粉象牙末紅粉霜爲
細末摻一切金瘡及腫毒生肌止痛　廣利
方金瘡出血麒麟竭末傅之立愈　醫林集
要產後血衝心胸喘滿命在須臾用血竭沒
藥各一錢研童便和酒調服　究原方收斂
瘡口血竭末一字龍腦少許大棗燒灰半錢
同研津調塗之　摘玄方胸中血塊血竭沒

補鹹主消散瘀血生新血之要藥故主破積血金瘡止痛生肉主五臟邪氣者卽邪熱氣也帶下者溼熱傷血分所致也甘鹹能凉血除熱故悉主之蘇恭主心腹卒痛李珣以之治傷折打損一切疼痛血氣攪刺內傷血聚者誠爲此耳此藥產外國極難得眞者理傷折有奪命之功

主治參互

同乳香沒藥自然銅麻皮灰狗頭骨煅存性

與衆藥同研化作飛塵也

龍腦香味辛苦微寒一云溫平無毒主心腹邪氣風溼積聚耳聾明目去目赤膚翳

疏○龍腦香稟火金之氣以生本經味辛苦氣微寒無毒其香爲百藥之冠凡香氣之甚者其性必溫熱李珣言溫元素言熱是矣氣芳烈味大辛陽中之陽升也散也性善走竄開竅無往不達芳香之氣能辟一切邪惡辛

藥各一兩滑石牡丹皮各一兩同煮過爲末醋糊丸梧子大空心服之　醫林集要嵌甲疼痛血竭末傅之

簡誤

凡使勿用海母血真相似只是味鹹幷腥氣騏驎竭味微鹹甘似梔子氣也又云嚼之不爛如蠟者爲上凡血病無瘀積者不必用日華子云此藥性急不可多使却引膿用時勿

桑磠堿牛黄傅一切疔腫癰疽神效　聖濟總錄目生膚翳龍腦爲末日點三五度　御醫院方頭目風熱上攻用龍腦末半兩南蓬砂末一兩頻嗃兩鼻　瀕湖集簡方風熱喉痺燈心一錢黄蘗五分竝燒存性白礬七分煅過片腦三分爲末每以一二分吹患處此陸一峰家傳絶妙方也　又方鼻中息肉垂下者用片腦點之自入　夷堅志傷寒舌出

熱之性能散一切風溼故主心腹邪氣及風溼積聚也耳聾者竅閉也開竅則耳自聰目赤膚瞖者火熱甚也辛溫主散能引火熱之氣自外而出則目自明赤痛膚瞖自去此從治之法也別錄又主婦人難產者取其善走開通關竅之力耳

主治參互

同乳香沒藥雄黃紅藥子烏雞骨白及白斂

紫草汁半杯和勻入龍腦一分溫服良久下
瘀血一二行瘡即紅活此治痘瘡黑靨惡候
醫所不治者百發百中

簡誤

宗奭云此物大通利關膈熱塞大人小兒風
涎閉塞及暴得驚熱甚爲濟用然非常服之
藥震亨云龍腦屬火世知其寒而通利未達
其熱而輕浮飛越喜其香而貴重動輒與麝

過寸者梅花片腦半分爲末摻之隨手而愈

又方中風牙噤無門下藥者開關散指之

五月五日午時用龍腦天南星等分爲末每

以一字指齒二三十遍其口自開　經驗方

痘瘡狂躁心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色赤

未透者用龍腦一錢細研旋以猪心血丸芡

子大每服一丸紫草湯下少時心神便定得

睡發瘡　總微論用獖猪第二番血清半杯

宜入點藥設誤點之必致昏暗難療

蕪荑味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒去三蟲化食逐寸白散腸中嗢嗢喘息

疏○蕪荑稟金氣而生於春陽之令本經味辛氣平無毒甄權加苦李珣加溫詳其功用應是苦辛溫平之藥非辛溫則不能散五臟皮膚骨節中邪毒氣非苦平則不能去三蟲

同爲桂附之助然人之陽易動陰易虧不可不思杲曰龍腦入骨風病在骨髓者宜用之爲引經若風在血脉肌肉輒用腦麝反引風入骨髓如油入麪莫之能出也觀三公之言則龍腦之爲害可知凡中風非外來之風邪乃因氣血虛而病者忌之小兒吐瀉後成驚者爲慢脾風切不可服急驚屬實熱可用慢驚屬虛寒不可用眼目昏瘖屬肝腎虛者不

荑生檳榔各四兩爲末蒸餅丸如梧子每服二十丸白湯下　錢氏小兒直訣疳熱有蟲瘦悴久服充肌用蕪荑一兩黃連一兩爲末豬膽汁七枚和入盌内飯上蒸之一日蒸一次九蒸乃入麝香半錢湯浸蒸餅和丸菉豆大每服五七丸至二十丸米飲下　危氏得效方蟲牙作痛以蕪荑仁安蛀孔中及縫中甚效　入藥用大者小者卽榆莢不堪入藥

化食逐寸白療腸中嘔嘔喘息然察其所主
雖能除風淫邪氣之爲害而其功則長於走
腸胃殺諸蟲消食積也故小兒疳瀉冷痢爲
必資之藥

主治參互

同肉豆蔻胡黃連盧會使君子青黛五穀蟲
雷丸檳榔橘皮治小兒疳熱瀉痢及腹大羸
瘦面黃好喫泥土　本事方制殺諸蟲生蕪

膈肺胃之分及入大腸也其主風痒痲痺通
利關節止風痛者蓋肺主皮毛胃主肌肉風
寒溼入於二經則皮膚瘙痒或作痛或痲木
此藥有苦泄辛散之功兼能引諸風藥入於
二臟故爲治風所需風邪旣散則關節自然
通利矣其瘵勞氣咳嗽背膊悶倦者蓋亦指
風寒鬱於上焦則肺氣滯而爲悶倦咳嗽經
曰肺苦氣上逆急食苦以泄之枳殼味苦能

除痱證殺蟲外他用甚稀故不著簡誤
枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節
勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消
脹滿大腸風安胃止風痛
疏○枳殼氣味所主與枳實大畧相同但枳
實形小其氣全其性烈故善下達如少年猛
悍之將勇往直前而一無回顧者也枳殼形
大其氣散其性緩故其行稍遲是以能入胸

荆芥芍藥黃芩當歸生地黃地榆側栢葉治腸風下血初起者神效　同荆芥苦參防風蒼耳草敗蒲煎湯沐浴治風疹作痒　同檳榔芍藥黃連升麻葛根甘草紅麯滑石治滯下裏急後重　得人參麥冬治氣虛大便不快　同肉桂治右脇痛

簡誤

枳殼泄肺能損至高之氣肺氣虛弱者忌之

泄至高之氣故主之也又肺與大腸爲表裏
風邪入肺則并入大腸風熱相搏而爲腸風
下血若寒下泄之氣則血熱清而風自除矣
其主散畱結胸膈痰滯逐水消脹滿安胃諸
證悉與枳實相同弟其氣稍緩耳

主治叅互

同蘇子橘皮桔梗木香白豆蔻香附治上焦
壅氣脹滿因於寒　同黄連槐花乾葛防風

更用此耗散之藥耶正經所謂損不足而虛
其虛豈不大謬哉古方有瘦胎飲者爲湖陽
公主而設以彼奉養太過其氣必實故用此
以耗其有餘之氣則胎易產今人不知古人
立方之意一概濫施誤甚誤甚

枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如
麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣
輕身除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下

脾胃虛中氣不運而痰壅喘急者忌之咳嗽
不因於風寒入肺氣壅者服之反能作劇咳
嗽陰虛火炎者服之立致危殆一槩胎前產
後咸不宜服今世多用以治婦人胎氣不安
或至八九月爲易產之劑動輒資用殊不知
婦人懷孕全賴氣血以養胎氣血充足則胎
自易產且娠婦至八九月精神困倦四肢軟
弱飲食減少動息喘促何莫非虛弱之證而

心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止溏洩者
是其本分內事皆足陽明太陰受病二經氣
滯則不能運化精微而痰癖停水結實脹滿
所自來矣胃之上口名曰賁門賁門與心相
連胃氣壅則心下亦自急痞痛邪塞中焦則
升降不舒而氣上逆肝木鬱於地下則不能
條達而脇痛得其破散衝走之力則諸證悉
除所以仲景下傷寒腹脹實結者有承氣湯

急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止溏洩明目

疏○枳實感天地苦寒之氣以生故其味苦

氣寒無毒別錄雷公加酸甄權加辛察其功

用必是苦爲最而酸辛次之氣味俱厚陰也

入足陽明太陰經細詳神農主治與本藥氣

味大不相侔究其所因必是枳殼所主蓋二

物古文原同一條後人分出時誤入耳其別

錄所主除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿

甘草砂仁爲枳朮丸治心下痞滿因於食
入陷胸湯治傷寒寒熱結胸　入大小承氣
湯治傷寒熱邪入裏結實脹滿痛不可當數
日不更衣者

簡誤

此藥性專消導破氣損眞觀朱震亨云瀉痰
有衝墻倒壁之力其爲勇悍之氣可知凡中
氣虛弱勞倦傷脾發爲痞滿者當用補中益

胸中痞痛者有陷胸湯潔古療心下痞滿者
有枳朮丸壅滞既去則胃氣自安而溏洩亦
止矣未云明目者經曰目得血而能視氣旺
乃能生血損氣破散之性豈能明目哉無是
理也

主治參互

同三稜蓬莪青皮檳榔爲消磨堅積之劑然
須能食脾胃健者宜之　同白朮橘皮厚朴

補益之功也時醫不識病之虛實藥之補瀉
往往概施損人眞氣爲厲不淺設誤投之雖
多服參耆補劑亦難挽其刻削之害也世人
多蹈其弊故特表以爲戒

厚朴味苦溫大溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱
驚悸氣血痺死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣
療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩
痢淋露除驚去畱熱心煩滿厚腸胃

氣湯補其不足則痞自除此法所當忌也脹
滿非實邪結於中下焦手不可按七八日不
更衣者必不可用挾熱下痢亦非燥糞畱結
者必不可用傷食停積多因脾胃虛不能運
化所致愼勿輕餌如元氣壯實有積滯者不
得已用一二劑病已即去之即潔古所製枳
朮丸亦爲脾胃有積滯者設積滯去則脾胃
自健故謂之益脾胃之藥非消導之外復有

能散結苦能燥溼溫熱能袪風寒故悉主之也別錄又主溫中消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢心煩滿者何莫非腸胃氣逆壅滯及痰飲留結飲食生冷所致得此下洩開通溫熱煖胃則諸證不求其止而止矣至於淋露雖屬下焦爲病然多因胃家溼熱下流三蟲亦腸胃溼熱所生苦能燥溼殺蟲故亦主之也本經又主驚悸

疏○厚朴稟地二之氣以生兼得乎春陽之氣而成故其味苦其氣溫甄權苦辛大熱應是辛熱苦溫之藥辛熱太過則其性宜有毒以其得陽氣之正故無毒耳氣味俱厚陽中之陰降也入足太陰手足陽明經其主中風傷寒頭痛寒熱氣血痺死肌者蓋以風寒外邪傷於陽分則爲寒熱頭痛風寒溼入腠理則氣血凝澀而成痺甚則肌肉不仁此藥辛

溼熱作瀉　同檳榔木香黃連滑石橘皮甘
草白芍藥治滯下初起　同白朮人參白芍
藥茯苓消腹脹　佐生薑橘皮藿香砂仁半
夏止胃寒嘔吐　同三稜蓬茂檳榔人參青
皮治積年冷癖堅塊　同蒼朮橘皮甘草爲
平胃散治胸中敦厚之氣使飲食倍增　聖
惠方治痰壅嘔逆心胸滿悶不下飲食用厚
朴一兩薑汁炙黃爲末米飲調下二錢匕

及别錄除驚去畱熱者皆非其所宜驚悸屬
心虛於脾胃絕無相干氣味大溫之藥又豈
能去畱熱哉至益氣厚腸胃蓋亦指邪氣去
正氣自益之謂積滯消腸胃自厚之意耳非
消散之外復有補益之功也用者詳之

主治悉互

同陳皮枳殼麥蘖草果山查砂仁欝紅治傷
食腹脹　同橘皮黃連甘草蒼白朮葛根治

厚朴氣味辛溫性復大熱其功長於泄結散
滿溫煖脾胃一切飲食停積氣壅暴脹與夫
冷氣逆氣積年冷氣入腹腸鳴虛吼痰飲吐
沫胃冷嘔逆腹痛泄瀉及脾胃壯實之人偶
感風寒氣實人誤服參耆致成喘脹誠爲要
藥然而性專消導散而不收畧無補益之功
故凡嘔吐不因寒痰冷積而由於胃虛火氣
炎上腹痛因於血虛脾陰不足而非停滯所

張仲景金匱方治腹脹脉數厚朴三物湯用厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎取五升入大黄四兩再煎取三升溫服一升轉動更服不動勿服　又七物厚朴湯治腹痛脹滿用厚朴半斤甘草大黄各三兩棗十枚枳實五枚桂二兩生薑五兩以水一斗煎取四升溫服八合日三嘔者加半夏五合

簡誤

痛產後中滿作喘產後泄瀉反胃已上諸證法所咸忌若誤投之輕病變重重病必危世人不究其原一概濫用雖或一時未見其害而清純冲和之氣默爲之耗矣可不慎哉

茗苦櫒茗味甘苦微寒無毒主瘻瘡利小便去痰熱渴令人少睡○苦櫒主下氣消食

疏○茗稟土中之清氣兼得春初生發之意本經味甘氣微寒無毒藏器言苦然亦有不

致洩瀉因於火熱暴注而非積寒傷冷腹滿
因於中氣不足氣不歸元而非氣實壅滯中
風由於陰虛火炎猝致僵仆而非西北眞中
寒邪傷寒發熱頭疼而無痞塞脹滿之候小
兒吐瀉乳食將成慢驚大人氣虛血槁見發
膈證老人脾虛不能運化偶有停積娠婦惡
阻水穀不入娠婦胎升眩暈娠婦傷食停冷
娠婦腹痛瀉利娠婦傷寒傷風產後血虛腹

腸胃則食自消矣

主治參互

同黃連酸棗仁生用通草蓮實治多睡好眠

同當歸川芎烏梅黑豆生地黃土茯苓甘

菊花治頭痛因於血虛有火者　直指方熱

毒下痢蠟茶爲末蜜水煎服白痢以薑汁同

水煎服兩三服卽愈

簡誤

苦者氣薄味厚陰中微陽降也入手太陰少
陰經太陰爲清肅之臟喜凉而惡熱熱則生
痰而津液竭故作渴也獲瘠者大腸積熱也
小便不利者小腸熱結也甘寒入心肺而除
熱則津液生痰熱解臟氣旣清腑病不求其
止而止矣令人少睡者蓋心藏神神昏則多
睡清心經之熱則神常自惺寂故不寐也下
氣消食者苦能下泄故氣下火降而兼滌除

味甘氣芬者飲之反致疾耶但苦澀野氣集
痿莖枯非道地所産者服之不利心脾故不
宜飲酒後不宜用能成飲證

山茱萸味酸平微溫無毒主心下邪氣寒熱溫
中逐寒溼痺去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風
風氣去來鼻塞目黃耳聾面皰溫中下氣出汗
强陰益精安五藏通九竅止小便利久服輕身
明目强力長年

凡茶之種類極多方宜大異要皆以味甘不澀氣芬如蘭摘於夏前者爲良夫茶稟天地至清之氣生於山谷磽瘠砂土之中不受纖芥穢滓專感雲露之氣以爲滋培故能滌腸胃一切垢膩寧非木中清貴之品哉昔人多以其苦寒不利脾胃及多食發黃消瘦之說此皆語其粗惡苦澀品類最下者言之耳昔雅州蒙山出一種茶服四兩卽爲地僊豈有

虛熱風邪消散則心下腸胃寒熱自除頭目亦清利而鼻塞面皰悉愈也逐寒溼痺者經曰邪之所湊其氣必虛總藉其辛溫散結行而能補也至於三蟲亦腸胃溼熱所生溼去則蟲自除能溫中則氣自下汗自出矣凡四時之令春氣煖而生秋氣凉而殺萬物之性喜溫而惡寒人身精氣亦賴溫煖而後充足況肝腎在下居至陰之位非得溫煖之氣則

疏○山茱萸感天地春生之氣兼得木之酸
味神農氣平別錄微溫總言其得春氣之正
耳岐伯甄權加辛然嘗其味必是酸多辛少
入足厥陰足少陰經陽中之陰降也其治心
下邪氣寒熱腸胃風邪寒熱頭風風氣去來
鼻塞面皰者皆肝腎二經所主二經虛熱故
見前證肝爲風木之位經曰諸風掉眩屬肝
木此藥溫能通行辛能走散酸能入肝而斂

同菟絲子肉蓯蓉巴戟天鹿茸牛膝白膠車前子枸杞子生地黄沙苑蒺藜麥門冬能添精固髓煖腰膝益陽道令人有子　同人參五味子牡蠣益智子治老人小便淋瀝及遺尿　同人乳沙苑蒺藜熟地黄人參麥門冬牛膝甘菊花治腦骨痛腦爲髓之海髓足則腦痛自除　同石菖蒲甘菊花地黄黄蘗五味子治腎虛耳聾　同杜仲牛膝地黄白膠

孤陰無以生此藥正入二經氣溫而主補味
酸而主歛故精氣益而陰强也精益則五臟
自安九竅自利又腎與膀胱爲表裏膀胱虛
寒則小便不禁耳爲腎之外竅腎虛則耳聾
肝開竅於目肝虛則邪熱客之而目黃二經
受寒邪則爲疝瘕二臟得補則諸證無不瘳
矣輕身强力長年者益精安五臟之驗也

主治參互

疏○紫葳即凌霄花也稟春氣以生故其味酸氣微寒無毒花開於夏而色赤味應帶苦入肝行血之峻藥故主婦人產乳餘疾及崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦諸證至於養胎決非其性所宜用者慎之

主治參互

同當歸紅花川芎牛膝地黃延胡索桃仁蘇方木五靈脂治壯實婦人經閉　普濟方嬰

山藥治腎虛腰痛　入六味地黄丸爲腎虛

而有溼熱者所須

簡誤

命門火熾强陽不痿者忌之膀胱熱結小便

不利者法當清利此藥味酸主歛不宜用陰

虛血熱不宜用即用當與黄檗同加

紫葳味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥

瘕血閉寒熱羸瘦養胎

水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二
兩灌之立瘥
疏○胡桐淚稟地中至陰之氣而兼水化故
味鹹苦氣大寒無毒氣味俱厚陰中之陰也
入足陽明經經曰熱淫於內治以鹹寒又曰
在高者因而越之苦以湧吐寒以勝熱故主
大毒熱心腹煩滿取吐而效也牛馬性熱而
又犯熱病所以急黃黑汗也鹹寒能除大熱

兒百日內無故口青不飲乳用凌霄花大藍葉芒硝大黃等分爲末以羊髓和丸梧子大每研一丸乳送下便能喫乳熱者可服寒者忌之

簡誤

紫葳長於破血消瘀凡婦人血氣虛者一概勿施胎前斷不宜用

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿

嗽　聖濟總錄牙齒蠹黑乃腎虛也胡桐淚一兩丹砂半兩麝香一分爲末摻之除口齒藥外他用甚稀故不著簡誤

猪苓味甘苦平無毒主痎瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老

疏○猪苓稟戊土之陽氣得風木之陰氣本經謂其味甘應兼淡苦其氣平而無毒氣味俱薄降也陽中陰也入足太陽足少陰經其

故亦主之日華子以之治風蟲牙齒痛李珣
謂其能治骨槽風齒蠶元素言瘰癧非此不
能除皆資其苦能殺蟲鹹能入骨軟堅大寒
能除極熱之用耳

主治參互

聖惠方牙疼出血胡桐淚半兩研入麝香少
許夜夜貼之　又方牙疳宣露膿血臭氣者
胡桐淚一兩枸杞根一升每用五錢煎水熱

苓人參橘皮朮澤瀉治水腫之屬陽分者佐白芍藥生地黃桑寄生桑根白皮茯苓澤瀉琥珀石斛薏苡仁肉桂治水腫之屬陰分者均爲要藥其功長於利水故善除溼

簡誤

寇宗奭曰猪苓利水之功多久服必損腎氣昏人目潔古曰淡滲太燥能亡津液無溼證勿服皆確論也有溼尚宜暫用久服斷乎不

主痎瘧者瘧必由暑暑必兼溼淡以利竅引
暑溼之氣從小便出所以分消之也淡滲之
性故利水道溼勝則身重溼去則身輕利竅
之藥必能走泄精氣其曰久服耐老必無是
理矣解蠱毒疰不祥義將安出亦未可盡信
也

主治參互

入五苓散爲除溼之要藥　佐白芍藥白茯

竅於口鼻凡邪惡鬼忤與夫疫癘之氣侵人悉從口鼻而入此藥辛溫煖胃辟惡散邪故能主諸證也胃煖則宿食自消辛散則蠱毒亦解又腎與膀胱爲表裏虛則寒客之而冷氣攻衝背膂辛溫能散寒邪其性又善下走則冷氣攻衝自止也性溫走泄故復能散婦人血凝氣滯微苦而辛故又能療小兒腹中諸蟲也

可

烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲

疏○烏藥稟地二之氣以生故味辛氣溫無毒然嘗其味亦帶微苦氣亦微香氣厚於味陽也入足陽明少陰經其主中惡心腹痛疰忤鬼氣天行疫瘴者皆足陽明受病陽明開

腫吐瀉轉筋癥癖刺痛中惡心腹痛鬼氣疰忤天行疫瘴婦人血氣痛用天台烏藥一百兩沉香五十兩人參三兩炙甘草四兩爲末每服半錢薑鹽湯空心點服

簡誤

烏藥辛溫散氣病屬氣虛者忌之世人多以香附同用治女人一切氣病不知氣有虛有實有寒有熱冷氣暴氣用之固宜氣虛氣熱

主治叅互

同沉香木香白豆蔻香附橘皮檳榔治婦人
氣實暴氣壅脹　濟生方治七情鬱結上氣
喘急用四磨湯降中兼升瀉中帶補其方以
人參烏藥沉香檳榔各磨濃汁七分煎細細
嚥之　和劑局方烏沉湯治一切氣一切冷
補五臟調中壯陽煖腰膝去邪氣冷風麻痺
膀胱腎間冷氣攻衝背膂俛仰不利風水毒

成外受金刃及杖傷作瘡亦皆血肉受病血肉傷則瘀而發熱作痛此藥苦能泄辛能散寒能除熱水屬陰血亦屬陰以類相從故能入血分散瘀血治血熱諸瘡及卒然下血證也肝開竅於目目得血而能視肝經血熱則目爲赤痛膚翳散肝經之血熱則目病除矣

主治參互

同延胡索乳香乾漆鼈甲琥珀爲末治產後

用之能無貽害耶以故婦人月事先期小便
短赤及咳嗽內熱口渴口乾舌苦不得眠一
切陰虛內熱之病皆不宜服

沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸
惡瘡痔漏卒下血目中瞖暈痛膚赤

疏○沒藥禀金水之氣以生故味苦平無毒
然平應作辛氣應微寒氣薄味厚陰也降也
入足厥陰經凡惡瘡痔漏皆因血熱瘀滯而

各半兩酒調成膏攤貼之　奇效良方金刃
所傷未透膜者乳香沒藥各一錢以童子小
便半盞酒半盞溫化服之　圖經本草婦人
腹痛內傷疞刺沒藥末一錢酒服便止又治
婦人血暈方同　婦人良方產後惡血沒藥
血竭末各一錢童便溫酒各半盞煎沸服良
危氏得效方女人異疾月事退出皆作禽
獸之形欲來傷人先將綿塞陰戶乃頓服沒

血暈有神效　加人參澤蘭生地益母草蘇
木作湯送前藥治兒枕痛及惡露未盡腹痛
寒熱等證立效　同乳香白及白歛紫花地
丁半枝蓮夏枯草忍冬藤連翹甘菊貝母治
一切癰疽疔腫　同乳香當歸牡丹皮牛膝
續斷川芎番降香穿山甲治內傷胸脇骨痛
入一切膏藥能消毒止痛長肉　御藥院
方筋骨損傷米粉四兩炒黃入沒藥乳香末

經絡血分血氣不行故壅滯作腫痛也沒藥
善通壅滯之血血行則氣亦行氣血流通則
腫痛自止矣故爲諸瘡癰及金瘡杖瘡跌撲
傷損腹中血結作痛之要藥而不主諸虛也
安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰
疏○安息香稟火金之氣而有水故味辛苦
氣平而芬香性無毒氣厚味薄陽也入手少
陰經少陰主藏神神昏則邪惡鬼氣易侵芬

藥末一兩白湯調下即愈

簡訣

孕婦不宜服凡骨節痛與夫胸腹脇肋痛非瘀血停留而因於血虛者不宜用產後惡露去多腹中虛痛者不宜用癰疽已潰不宜用目赤膚翳非血熱甚者不宜用大槩其功長於通滯血血滯則氣亦壅氣血壅滯則經絡滿急經絡滿急故發腫作痛打撲踠跌亦傷

仙人杖味鹹平一云冷無毒主噦氣嘔逆辟痁小兒吐乳大人吐食並水煑服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒爲末服方寸匕

疏○仙人杖此笋之將成竹時立死者得笋之氣已過稟竹之性未全故味鹹氣平無毒其功用在竹茹竹黃之間所主噦氣嘔逆小兒吐乳辟痁大人吐食痔瘡者竹茹之用也療小兒驚癇及夜啼者竹黃之用也雖其形

香通神明而辟諸邪故能主鬼疰惡氣也

主治參互

同鬼臼犀角牛黃丹砂乳香蘇合香龍齒雄黃麝香治鬼疰尸疰殺癆蟲寐魘暴亡及大人小兒卒中邪惡氣　奇效良方小兒驚邪安息香一豆許燒之自除

簡誤

病非關邪惡氣侵犯者不宜服

中陽也入足太陰陽明經二經虛則外邪易入爲霍亂中惡辛以散之溼熱內侵爲痢蠶久痢苦以泄之又脾胃主肌肉溼熱浸淫則生蟲而爲疥癬苦能殺蟲平即微寒溼熱去而疥癬除矣其主潄齒洗目者亦取其苦寒殺蟲辛平散風熱之意耳李珣以之治腰脚不遂血脉頑痺腿膝疼痛之證其爲辛苦之劑無疑矣

已痿而其性尚存故能療諸證也　又秘方
用此蘸麻油於空室中燃之取滴下油塗癧
疽已潰長肉如神他用甚稀故無主治簡誤

海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除
疳䘌疥癬牙齒蟲痛並煑服及含之水浸洗目
除膚赤

疏○海桐皮稟木中之陰氣以生本經味苦
氣平無毒然詳其用味應帶辛氣薄味厚陰

虛血少火熾而得者勿服　同眞川槿皮輕
粉蛇牀子山大黃爲末傅癬瘡

簡誤

腰痛非風溼者不宜用

大腹微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰
膈醋心並以薑鹽同煎入疏氣藥良

疏○大腹皮卽檳榔皮也其氣味所主與檳
榔大畧相同第檳榔性烈破氣最捷腹皮性

主治参互

續傳信方治腰膝痛不可忍用海桐皮二兩牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡仁二兩生地黃十兩㕮咀以綿包裹入無灰酒二斗浸之冬二七日夏一七日空心飲一盞每日早午晚各飲一盞長令醺醺合時不得添減禁毒食此藥治因風溼溼熱流注下焦腰膝爲病若因陰

參

簡誤

鴆鳥多集檳榔樹上凡用檳榔皮宜先洗去黑水復以酒洗後以大豆汁再洗過曬乾入灰火煨用性與檳榔相似病涉虛弱者禁勿施用

合歡味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲

緩下氣稍遲入足陽明太陰經二經虛則寒
熱不調逆氣攻走或痰滯中焦結成膈證或
溼熱鬱積酸味醋心辛溫煖胃豁痰通行下
氣則諸證除矣大腸壅毒以其辛散破氣而
走陽明故亦主之也

主治參互

同白朮茯苓車前子木瓜桑白皮五加皮猪
苓澤瀉薏苡仁蠡魚治水腫有效虛者加人

骨者皆取其能補心脾生血脉之功耳

主治參互

與白蠟同入膏能長肌肉續筋骨甚捷　獨

行方肺癰唾濁心胸甲錯取夜合皮一掌大

水三升煎取一半分二服　百一選方撲損

折骨夜合樹皮去粗皮炒黑色四兩芥菜子

炒一兩爲末每服二錢溫酒臥時服以滓外

傅接骨神妙　子合橘核木瓜牛膝能治疝

疏○合歡稟土氣以生故味甘氣平無毒入手少陰足太陰經土爲萬物之母主養五臟心爲君主之官本自調和脾虛則五臟不安心氣躁急則遇事拂鬱多憂甘主益脾脾實則五臟自安甘可以緩心氣舒緩則神明自暢而歡樂無憂神明暢達則覺照圓通所欲咸遂矣嵇叔夜養生論云合歡蠲忿正此之謂歟其主輕身明目及大明主消癰疽續筋

小兒面鼻疳瘡者皆從外治取其苦能殺蟲

酸平能斂浮熱性燥能主風溼瘡癢膿水五

痔下血者大腸積熱也大腸與肺爲表裏肺

得斂肅則大腸亦自淸寧也藏器療腸虛泄

利日華子主生津液消酒毒時珍謂其斂肺

降火化痰飲止咳嗽消渴盜汗斂潰瘡金瘡

收脫肛子腸墜下者悉假其入肺淸金收斂

固脫之功耳

溼熱者加黃蘗寒溼者加茴香子
氣味和平與病無忤故不著簡誤
五倍子味苦酸平無毒療齒宣疳䘌肺藏風毒
流溢皮膚作風溼癬瘡瘙癢膿水五痔下血不
止小兒面鼻疳瘡
疏○五倍子得木氣而兼金水之性其味苦
酸澀氣平無毒氣薄味厚斂也陰也入手太
陰足陽明經本經主齒宣疳䘌風溼癬瘡及

乾了又擂勻又曬曬至可丸方丸彈子大曬
乾收用其味甘酸能化一切膠痰　又方脾
泄久利五倍子炒半斤陳倉米炒一升丁香
細辛木香各三錢川椒五錢爲末每服一錢
蜜湯下日二服忌生冷魚肉　和劑局方玉
鎖丹治腎經虛損心氣不足思慮太過眞陽
不固溺有餘瀝小便白濁如膏夢中頻遺盜
汗虛煩食減之力此方性溫不熱極有神效

主治參互

同地骨皮小薊皮硝甘草苦參葱頭煎湯洗楊梅結毒　集靈方自汗盜汗用五倍子研末津調塡臍中縛定一夜即止　化痰生津噙化丸用五倍子安大鉢頭內用煮糯米粥湯浸蓋好安靜處七日後常看待發芽黃金色又出黑毛然後將箸試之若透內無硬即收入細丸鉢中擂如醬連鉢日中曬至上皮

婦人良方產後腸脫五倍子末摻之　博濟方風毒攻眼腫癢澀痛不可忍者或上下瞼赤爛或浮翳瘀肉侵睛神效驅風散五倍子一兩蔓荊子一兩半爲末每用二錢水二盞銅石器內煎汁去滓乘熱洗大能明目去澀　楊子建護命方牙齦腫痛五倍子兩許炙焙研末以半錢傅痛處片時唾去涎內服去風熱藥　端效方白口惡瘡狀似木耳不

五倍子一斤白茯苓四兩龍骨二兩爲末水
糊丸梧子大每服七十丸食前鹽湯送下日
三服　百一選方臟毒下血五倍子不拘多
少爲末大鯽魚一枚去腸胃鱗腮填藥令滿
入瓶內煅存性爲末每服一錢溫酒下　直
指方大腸痔疾五倍子煎湯薰洗或燒煙薰
之自然收縮　三因方脫肛不收用五倍子
末三錢入白礬少許水一椀煎湯洗之立效

簡誤
五倍子性燥急而專收斂欬嗽由於風寒外觸者忌之瀉利非腸虛脫者忌之欬嗽由於肺火實甚者忌之若誤服之反致壅塞喘滿以其酸斂太驟火氣無從泄越故耳

天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天吊鎮心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五藏

疏〇天竺黃竹之津氣結成其氣味功用與

拘大人小兒並用五倍子靑黛等分爲末以
筒吹之　儒門事親赴筵散治口舌生瘡五
倍子蜜陀僧等分爲末漿水漱過乾貼之院
方加曉蠶蛾　杏林摘要魚口瘡毒初起未
成膿者用五倍子炒黃研入百草霜等分以
臘醋調塗患處一日一夜卽消　拔萃方一
切金瘡五倍子降眞香等分炒研末傅之皮
肉自痊

同牛黃犀角丹砂茯神琥珀酸棗仁遠志釣藤鈎治小兒驚癇癲疾有痰者加牛膽南星貝母竹瀝屬虛者去南星加人參　錢一方小兒驚熱天竺黃二錢雄黃牽牛末各一錢研勻麪糊丸粟米大每服三五丸薄荷湯下除小兒驚癇痰熱外無別用故不著簡誤

蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚翳赤澀多眵淚消目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼

竹瀝大同小異第竹黃氣微寒而性亦稍緩故爲小兒家要藥入手少陰經小兒驚風天吊諸風熱者亦猶大人熱極生風之候也此藥能除熱養心豁痰利竅心家熱清而驚自平主君安而五臟咸得滋養故諸證悉除也明目療金瘡者總取其甘寒凉血清熱之功耳

主治叅互

相似但芫花狹小而蜜蒙花差大爲異用者

宜詳辨之

主治叅互

同空青木賊生地黃蟬蛻白蒺藜穀精草决

明子羚羊角治青盲翳障　同甘菊花枸杞

子生地黃白蒺藜穀精草治肝腎虛目不能

遠視　同黃連赤芍藥防風荆芥穗黃蘗甘

菊花甘草龍膽草治風熱溼熱眼赤痛　同

疏○蜜蒙花禀土氣以生其蘁萌於冬而開
於春故氣平微寒味甘而無毒爲厥陰肝家
正藥觀本經所主無非肝虛有熱所致蓋肝
開竅於目目得血而能視肝血虛則爲青盲
膚翳肝熱甚則爲赤腫眵淚赤脉及小兒豆
瘡餘毒疳氣攻眼此藥甘以補血寒以除熱
肝血足而諸證無不愈矣好古謂其潤肝燥
守眞以之治畏日羞明誠謂此也形與芫花

神農本草經疏卷之十四

木部下品

總九十九種今疏其要者二十九種

巴豆　蜀椒　皂莢附子刺

訶黎勒　楝實附根　椿木葉附樗木

郁李仁　無食子　黃蘗根

雷丸　蘇方木　胡椒

南燭枝葉　橡實　石南

胡黃連白蕪荑使君子蟬蛻木賊蘆薈治小
兒疳積眼目不明　療眼疾外無他用故不
著簡誤

蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班猫毒可鍊餌之益血脉令人色好變化與鬼神通

疏○巴豆生於盛夏六陽之令而成于秋金之月故味辛氣溫得火烈剛猛之氣故其性有大毒別錄言生溫熟寒恐熟亦不甚寒氣薄味厚降也陽中陰也入手足陽明經其主破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水腫鬼毒

益智子　紫荊木　紫真檀
烏桕木　杉材　接骨木
樺木皮　木鼈子　番木鼈附　釣藤
赤檉木　水楊葉　柞木皮
椶櫚　木槿
巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒
熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩滌
五藏六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒

於陰故不利丈夫陰本經又主傷寒寒熱及
別錄煉餌之法悉非所宜豈有辛熱大毒之
物而能治傷寒寒熱及益血脉好顏色之理
哉

主治參互

同白礬枯過去巴豆單用礬研細吹入喉中
流出熱毒涎喉卽寬治急喉痺如神　一味
炒烟盡存性研膏治癰疽潰後腐肉不落傳

蠱疰邪物女人月閉者皆腸胃所治之位中有實邪留滯致生諸病故腸胃有病則五臟六腑閉塞不通此藥禀火性之急速兼辛溫之走散入腸胃而能蕩滌一切有形積滯之物則閉塞開水穀道利月事通而鬼毒蠱疰邪物悉爲之驅逐矣溫瘧者亦暑濕之氣入於腸胃也腸胃既清則溫瘧自止火能灼物故主爛胎及去惡肉性熱有大毒則必有損

瘡有蟲者巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油調硫黄輕粉末頻塗取効　仲景三物白湯治傷寒懊憹滿悶身無熱者爲寒結胷用桔梗三分巴豆一分去皮心熬黑貝母三分二味爲末內巴豆臼中杵之以白湯和服強人半錢弱者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯

簡誤

上卽拔毒去瘀生新　外臺秘要飛尸鬼擊
中惡心痛腹脹大便不通走馬湯用巴豆二
枚去皮心熬黃杏仁二枚以綿包椎碎熱湯
一合捻取白汁服之當下而愈量老少用之
　瑣碎錄天絲入咽凡露地飲食有飛絲入
上食之令人咽喉生瘡急以白礬巴豆燒灰
吹入卽愈　經驗方耳卒聾閉巴豆一粒綿
裹針刺孔通氣塞之取効　普濟方一切惡

昭矣然而更有未盡者巴豆稟火烈之氣沾人肌肉無有不灼爛者試以少許輕擦完好之膚須臾即發出一泡況腸胃柔脆之質下咽則徐徐而走且無論下後耗損真陰而腑臟被其熏灼能免無潰爛之患耶凡一槩湯散丸劑切勿輕投即不得已急證欲借其開通道路之力亦須炒熟壓令油極凈入分許即止不得多用

元素曰巴豆乃斬關奪門之將不可輕用世以之治酒病膈氣以其辛熱能開通腸胃鬱結耳第鬱結雖開而血液隨亡眞陰虧損從正曰傷寒風溫小兒痘瘡婦人產後用之下膈不死亦危奈何庸人畏大黃而不畏巴豆以其性熱而劑小耳豈知蠟匱之猶能下後使人津液枯竭胃熱口燥耗却天眞留毒不去他病轉生觀二公之言則巴豆之爲害昭

之陰本經味辛氣溫別錄大熱有毒氣味俱
厚陽也入手足太陰兼入手厥陰經其主邪
氣欬逆皮膚死肌寒濕痺痛心腹留飲宿食
腸澼下痢黃疸水腫者皆脾肺二經受病肺
出氣主皮毛脾運化主肌肉肺虛則外邪客
之爲欬逆上氣脾虛則不能運化水穀爲留
飲宿食腸澼下利水腫黃疸二經俱受風寒
濕邪則爲痛痺或成死肌或致傷寒溫瘧辛

蜀椒味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服頭不白輕身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人

疏○蜀椒禀火金之氣得南方之陽受西方

之物也外邪散則關節調內病除則血脉通
佐補陰涼血之藥則頭不白齒髮堅耐寒暑
輕身增年所自來矣

主治參互

同女貞子牛膝地黃何首烏旱蓮草枸杞子
沒食子桑椹子黃蘗人參南燭子能烏鬚黑
髮悅色駐顏　空心單服能收輕粉水銀毒
椒紅丸治元臟傷憊目暗耳聾服此百日

溫能發汗開腠理則外邪從皮膚而出辛溫
能煖腸胃散結滯則六腑之寒冷除腸胃得
溫則中焦治而留飲宿食腸澼下利水腫黃
疸諸證悉愈矣其主女子字乳餘疾者亦指
風寒外侵生冷內停而言洩精瘕結由下焦
虛寒所致此藥能入右腎命門補相火元陽
則精自固而結瘕消矣瘀鬼疰蠱毒殺蟲魚
毒者以其得陽氣之正能破一切幽暗陰毒

椒一兩炒蒼朮二兩土炒研末醋糊丸梧子大每五十丸米飲下　經驗方囊瘡痛痒紅椒七粒葱頭七箇煎水洗之　大全良方寒濕脚氣川椒二三升疎布囊盛之日以踏脚　仲景烏梅丸治蚘厥　宗奭方治盜汗將椒目微炒研細用半錢以生猪上唇煎湯一合睡時調服無不効　甄權方治腎虛耳中如風水鳴或如鍾磬之聲卒暴聾者用椒

覺身輕少睡足有力是其効也服及三年心智爽悟目明倍常面色紅悅髭髮光黑用蜀椒去目及閉口者炒出汗曝乾擣取紅一斤以生地黃擣自然汁入砂器中煎至一升候稀稠得所和椒末丸梧子大每空心煖酒下三十丸合藥時勿令婦人雞犬見　孫眞人方心腹冷痛以布裹椒安痛處用熨斗熨令椒出汗卽止　普濟方餐泄不化及久利小

虛冷者忌之陰痿腳弱由於精血耗竭而非
命門火衰虛寒所致者不宜入下焦藥用欬
逆非風寒外邪壅塞者不宜用字乳餘疾由
於本氣自病者不宜用水腫黃疸因于脾虛
而無風濕邪氣者不宜用一切陰虛陽盛火
熱上衝頭目腫痛齒浮口瘡衄血耳聾咽痛
舌赤消渴肺痿咳嗽咯血吐血等證法所咸
忌

目巴豆菖蒲同研細以松脂黄蠟溶和爲挺
納耳中抽之一日一易神驗　千金方水氣
腫滿椒目炒搗細每酒服方寸匕

簡誤

椒禀純陽之氣乃除寒濕散風邪溫脾胃煖
命門之聖藥然而肺胃素有火熱或欬嗽生
痰或嘈雜醋心嘔吐酸水或大腸積熱下血
咸不宜用凡泄瀉由於火熱暴注而非積寒

木氣平關竅利則風邪散諸證除也關竅旣利則神明自通精物邪氣安得不去哉又厥陰之脉循陰器而絡於肝厥陰客寒爲囊結辛溫散厥陰之寒則囊結解矣肺受風寒所迫爲欬嗽入肺散邪則咳嗽止矣鹹能軟堅溫主通行辛能開竅横走故又主腹脹滿消穀及婦人胞不落也宣壅導滯之性而云益精明目無是理矣

皂莢味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可爲沐藥

疏○皂莢禀木氣而兼火金之性故味辛微鹹氣溫有小毒氣味俱厚浮而散陽也入足厥陰手太陰陽明經厥陰爲風木之臟其主風痺死肌頭風淚出者皆厥陰風木爲病得金氣之厚者能勝木禀辛散之性者能利竅

同真珠象牙末牛黃氷片白殭蠶滴乳石土
茯苓治蛀痔神効　孫用和稀涎散治中風
昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流
涎斯須不治便成大病此證風涎潮於上膈
痺不通急宜吐之用大皂莢肥實不蛀者四
挺去黑皮白礬明者一兩爲末每用半錢重
者三字溫水調灌不大嘔吐只是微微稀冷
涎或出一升二升當待醒醒乃用藥調治不

〇子氣味與皂莢同炒舂去赤皮以水浸軟煮
熟糖漬食之疎導五臟風熱壅滯及治大腸
虛秘瘰癧惡瘡腫毒
〇刺功用與莢同第其銳利能直達瘡所爲癰
疽妬乳丁腫未潰之神藥蘇頌以米醋熬嫩
刺作煎塗癬瘡有奇効又治癘風惡瘡胎衣
不下殺蟲凡癰疽已潰不宜服孕婦亦忌之

主治参互

風蟲牙痛豬牙皂莢角食鹽等分爲末日指
之　袖珍方便毒腫痛豬牙皂角七片煨黄
去皮弦出火毒爲末空心溫酒服五錢婦人
妬乳同　直指方便毒癰疽皂角一條醋熬
膏傅之屢効　儒門事親便癰初起皂角子
七枚研末水服効　阮氏經驗方年久瘰癧
用不蛀皂角子一百粒米醋一升蓬砂二錢
同煮乾炒令酥看癧子多少如一箇服一粒

可便大吐之恐過劑傷人累効不能盡述

聖惠方胷中痰結皂莢三十挺去皮切水五

升浸一夜挼取汁慢熬至可丸如梧子大每

食後鹽漿水下十丸　又釣痰膏用半夏醋

煮過以皂角膏和匀入明礬少許以柿餅搗

膏丸如彈子大噙之　千金方二便關格皂

莢燒研粥飲下三錢立通宣明方鐵脚丸同

千金方鼻齆不通皂角末吹之　十全方

刺三斤燒灰蒸一時久日乾爲末食後濃煎大黃湯調一七飲之一旬眉髮再生肌潤目明

簡誤

皂莢利九竅疎導腸胃壅滯洗垢膩豁痰涎散風邪暴病氣實者用之殊効第似中風證由於陰虛火炎煎熬津液結而爲痰熱極生風以致猝然仆蹶世人多以稀涎散吐之損

十箇服十粒細嚼米湯下酒浸煮服亦可一
云虛人不可用蓬砂　同蟬蛻白殭蠶杏仁
芭蕉根白毛藤土茯苓獨核肥皂仁白蘚皮
連翹薏苡仁萆薢漢防已治下疳廣瘡神効
　同連翹白芷𦬊菊紫花地丁白及金銀花
甘草鼠粘子茜草地榆治下部癰疽腫毒
神仙傳崔言患大風惡疾雙目昏盲眉髮自
落鼻梁崩倒勢不可救遇異人傳方用皂角

血帶下朱震亨用以實大腸無非苦濇收斂

治標之功也

主治參互

得人參治肺虛受寒喘嗽　得橘皮砂仁主

冷氣入內心腹脹滿及因寒食不下　得益

智止氣虛寒小水不禁　佐樗根白皮止腸

澼瀉血　佐白朮蓮實止久洩因於虛寒

同蛇牀子五味子山茱萸杜仲續斷止虛寒

其不足竭其津液津液愈耗則經絡無以榮
養爲拘攣偏廢之證矣法所最忌也孕婦忌
服
訶黎勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食
疏○訶黎勒其味苦濇其氣溫而無毒苦所
以洩濇所以收溫所以通惟斂故能主冷氣
心腹脹滿惟溫故能下食甄權用以止水道
蕭炳用以止腸澼久洩蘇頌用以療腸風瀉

苦重瀉氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用亦

此意耳

楝實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺

三蟲疥瘍利小便水道根微寒療蚘蟲利大腸

即金鈴子

疏○楝實禀天之陰氣得地之苦味故其味

苦氣寒極苦而寒故其性有小毒氣薄味厚

陰也降也入足陽明手足大陰經經曰冬傷

帶下　同人參肉荳蔻則實大腸

簡誤

訶子性溫而味濇濇主斂不主散故咳嗽因於肺有實熱泄瀉因於濕熱所致氣喘因於火逆衝上帶下因於虛熱而不因於虛寒及腸澼初發濕熱正盛小便不禁因於腎家虛火法並忌之至於滯下必本濕熱喘嗽實由肺火用之立致殺人不可不深戒也東垣謂

蟲利大腸耳

主治參互

同牛膝木瓜橘核荔枝核杜仲巴戟天烏穠樹子蘹香治腎虛疝氣　瀕湖方棟實丸治癩疝腫痛或鈎腎偏墜痛不可忍用川楝子肉五兩分作五分一分用破故紙二錢炒黃一分用小茴香三錢食鹽半錢同炒一分用班蝥七枚去頭足同炒一分用萊菔子一錢

於寒春必病溫其主溫疾傷寒大熱煩狂者
總因寒邪鬱久至春變爲溫病邪在陽明也
苦寒能散陽明之邪熱則諸證自除膀胱爲
州都之官小腸爲受盛之官二經熱結則小
便不利此藥味苦氣寒走二經而導熱結則
水道利矣濕熱鬱積則內生諸蟲濕熱浸淫
則外爲疥瘍得大寒極苦之物則濕熱散故
能療諸蟲及疥瘍也根氣味相同故亦主殺

脾胃虛寒者不宜用

椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽皮主甘䘌樗木根葉尤良雷公云凡使椿根不近西頭者爲上採出拌生葱蒸半日剉細以袋盛掛屋南陰乾用

疏○椿禀地中之陰氣以生本經味苦有毒甄權言微熱震亨言凉而燥然考其用必是微寒苦燥之藥入手足陽明經本經主甘䘌及洗疥瘡風疽藏器去口鼻疳蟲疥䘌者因

同炒一分用牽牛子三錢同炒炒完揀去食
鹽萊菔子牽牛班蝥只留故紙茴香同研爲
末以酒打麪糊丸梧子大每五十丸空心酒
下　根同白蕪荑檳榔鶴蝨黃連牽牛雷丸
使君子錫灰烏梅蘆會殺腸胃一切蟲　集
簡方治小兒蚘蟲楝根皮同雞卵煑熟空心
服之次日蟲下
簡誤

七分入酒半盞服　外臺秘要小兒疳痢困
重者用樗根白皮搗粉以水和棗作大餺飩
子日曬少時又搗如此三遍以水煑熱空腹
吞七枚重者不過七服愈　子母秘錄小兒
疳疾椿根白皮日乾二兩爲末以粟米淘淨
研濃汁和丸梧子大十歲兒三四丸米飲下
量大小加減仍以一丸納竹筩中吹入鼻內
三度良　經驗方下利清血腹中刺痛椿根

腸胃有濕熱故現是證苦涼而燥所以外治
皆得也藏器又主殺蚘蟲蠱毒下血及赤白
久痢日華子主腸風瀉血蕭炳云得地榆主
疳痢孟詵云止女子血崩及產後血不止赤
帶皆取其苦能燥濕寒能除熱濇能收歛之
功耳採得去粗皮蜜炙用 樗功用相同

主治叅互

存仁方下血經年樗根白皮三錢水一盞煎

云洛陽一女子年四十六七耽飲無度多食
魚蟹畜毒在臟日夜二三十瀉大便與膿血
雜下大腸連肛門痛不堪忍醫以止血痢藥
不効又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血無
膿如此半年氣血漸弱食減肌瘦服熱藥則
腹愈痛血愈下服冷藥則注泄食減服溫平
藥則病不知如此期年垂命待盡或人教服
人參散一服知二服減三服膿血皆定遂常

白皮洗刮曬研醋糊丸梧子大空心米飲下三四十丸　婦人良方產後腸脫不能收拾者樗根取皮焙乾一握水五升連根葱五莖漢椒一撮同煎至三升去渣傾盆内乘熱熏洗冷則再熱一服可作五次用洗後睡少時忌鹽酢醬麵發風毒物及用心勞力等事

丹溪方女人白帶椿根白皮滑石等分爲末粥丸梧子大空腹白湯下一百丸　寇宗奭

郁李仁味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道

疏○郁李仁得木氣而兼金化本經味酸氣平無毒元素言辛苦性潤而降下陰也入足太陰手陽明太陽經其主大腹水腫面目四肢浮腫者經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰諸腹脹大皆屬於熱脾虛而濕熱客之則小腸不利水氣泛溢於面目四肢辛苦能潤熱結

服之而愈其方治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血痛甚多日不瘥用樗根白皮一兩人參一兩爲末每服二錢空心米飲調服忌油膩濕麵青菜菓子甜物雞猪魚羊蒜薤等

簡誤

脾胃虛寒者不可用崩帶屬腎家眞陰虛者亦忌之以其徒燥故也凡滯下積氣未盡者亦不宜遽用不入湯煎

腫滿氣急不得臥用郁李仁一大合擣和麵
作餅喫入口卽大便通泄氣便愈

簡誤

郁李仁性專降下善導大腸燥結利周身水
氣然而下後多令人津液虧損燥結愈甚乃
治標救急之藥津液不足者愼勿輕用

無食子味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉

疏○無食子禀春生之氣兼得西北金水之

降下善導癃閉小便利則水氣悉從之而出
矣甄權主腸中結氣關格不通日華子云泄
五臟膀胱結痛宣腰胯冷膿消宿食下氣元
素云破血潤燥李杲云專治大腸氣滯燥濇
不通均得之矣

主治參互

同當歸地黄麻仁麥門冬桃仁生蜜肉蓯蓉
治大便燥結不通甚者加大黄　楊氏產乳

同蓮鬚女貞子枸杞子地黃南燭子何首烏黃精旱蓮草朮人參爲烏鬚髮之勝藥　同覆盆子牡蠣枸杞子五味子車前子地黃蓮鬚龍骨鹿茸沙苑蒺藜魚膘膠砂仁黃蘗能補益精氣治一切夢遺洩精　仲景方治陰汗用無食子燒灰先以湯浴了布裹灰撲之甚良　宮氣方小兒久痢沒食子二箇熬黃研末作餛飩食之　聖濟總錄牙齒疼痛綿

性故味苦氣溫無毒金主歛肅大腸屬金以類相從故主赤白痢腸滑春爲發生之令溫能和脾胃養腠理故主生肌肉水爲潤下色黑而象腎故李珣以之益血生精和氣安神烏髭髮治陰痿諸證也得溫煖之氣復兼收歛之性故爲固濇精氣之要藥雷公云凡使勿犯銅鐵并被火驚者用顆小無杴米者妙用漿水於砂盆中研令盡焙乾再研如烏犀色入藥

主治參互

黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡瘻喉痺蛇犬咬毒研水服之亦含亦塗

疏○黃藥根得土中至陰之氣以生故其色黃味苦氣平無毒平即兼凉日華子加凉是矣氣薄味厚降多升少陰也入手少陰足厥陰經諸惡腫瘡瘻皆榮氣不從逆於肉裏所致蓋榮主血肝心又主血藏血之臟二經得苦凉之氣則血熱解榮氣和標證不求其止

裹無食子末一錢咬之涎出吐去　聖惠方

大小口瘡沒食子炮三分甘草一分研末摻

之月內小兒生者少許置乳上吮之入口卽

啼不過三次　奇効方足趾肉刺無食子三

枚肥皂莢一挺燒存性爲末醋和傅之立効

簡誤

赤白痢由於濕熱鬱於腸胃兼積滯多者不

宜用

茜草連翹牛旁子白芷貝母白藥子之屬治
一切疔腫癰疽本經并載赤藥俗名紅藥子
予嘗得一方以之爲君每四兩加白及白歛
各一兩乳香没藥各五錢丹砂雄黃各三錢
麝香龍腦香各一錢爲細末量瘡大小蜜調
敷瘡四圍中留大孔以綿紙護之時時以米
醋潤之其痛即減亦復易潰易收治一切發
背癰疽俱神効陰毒尤要如無赤藥子以黃

而止矣經曰一陰一陽結爲喉痺一陰者少
陰君火也一陽者少陽相火也解少陰之熱
相火自不妄動而喉痺瘳矣蛇犬咬毒亦血
分受熱毒所傷故也苦寒能凉血得土氣之
厚者又能解百毒也日華子以之療馬病蓋
馬性多熱亦取其苦寒除熱之義耳

主治 㕘互

同忍冬藤夏枯草白及白斂紫花地丁甘菊

爲末每服二錢煎薄膠湯下良久以新水調麪一匙頭服之　禹講師經驗方產後血暈惡物冲心四肢氷冷脣靑腹脹昏迷紅藥子一兩頭紅花二錢水二盞婦人油釵二隻同煎一盞服大小便俱利血自下也

簡誤

癰疽已潰不宜服癰疽發時不焮腫不渴色淡脾胃作泄者此爲陰證當以內補爲急解

藥子代之　孫思邈千金月令方療忽生癭疾以萬州黃藥子半斤須緊重者爲上如輕虛卽是他州者力慢須用加倍取無灰酒一斗投藥入中固濟缾口以糠火燒一伏時待酒冷乃開時時飲一杯不令絕酒氣經三五日後常把鏡自照覺消卽停飲不爾便令人項細也　聖惠方治吐血不止黃藥子一兩水煎服　簡要濟衆方治鼻衄不止黃藥子

勝氣薄味厚陰也降也入手足陽明經其主
殺三蟲白蟲寸白自出者腸胃濕熱甚也逐
毒氣胃中熱邪氣惡風汗出皮中熱結積者
腸胃邪熱盛也苦寒能除二經濕熱邪氣則
上來諸證自除作摩膏治小兒百病者以小
兒好食甘肥腸胃類多濕熱蟲積苦能殺蟲
除濕鹹寒能清熱消積故主之也凡蠱毒必
熱必辛苦寒能除辛熱故又主解蠱毒也利

毒次之藥子之類宜少服止可外敷
雷丸味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣
胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病
逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸
白自出不止久服令人陰痿
疏○雷丸稟竹之餘氣兼得地中陰水之氣
以生本經味苦氣寒別錄加鹹有小毒黃帝
岐伯桐君扁鵲云甘詳其所主應是苦鹹爲

寸白蟲雷丸水浸去皮切焙爲末五更初食
炙肉少許以稀粥飲服一錢七須上半月服
蟲乃下　除殺蟲外他用甚稀故不著簡誤
惟赤色者能殺人用時細擇去之
蘇方木味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲
死者水煑苦酒煑五兩取濃汁服之效
疏○蘇方木禀水土之氣以生故其味甘鹹
氣平無毒好古加辛降多於升陽中陰也入

丈夫不利女子者蓋以男子屬陽得陰而生故喜陰寒之味女子屬陰得陽而長故不利陰寒之物也別錄又云久服令人陰痿正見其過於苦寒偏至之氣能令陽道痿也

主治參互

同蕪荑使君子蘆會五穀蟲胡黃連青黛治小兒疳蚘有神　同檳榔鶴蝨楝根貫衆牽牛錫灰薏苡根殺腸胃一切蟲　經驗方下

下之功故能袪一切凝滯畱結之血婦人產
後尤爲所須耳

主治參互

同澤蘭川芎麥門冬生地黃蒲黃人參童便
益母草牛膝黑豆荊芥穗治產後血暈有神
同山查延胡索牡丹皮澤蘭當歸五靈脂
赤芍藥紅花治產後兒枕作痛加入乳香沒
藥治產後血癖不消因寒而得者加炒黑乾

足厥陰兼入手少陰足陽明經凡積血與夫
產後血脹悶欲死無非心肝二經爲病此藥
鹹主入血辛能走散敗濁瘀積之血行則二
經清寧而諸證自愈日華子主婦人血氣心
腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲
損瘀血女人失音血噤海藥主虛勞血癖氣
壅滯產後惡露不盡心腹攪痛及經絡不通
悉取其入血行血辛鹹消散亦兼有軟堅潤

產後惡露已盡由血虛腹痛者不宜用

胡椒味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除臟腑中風冷

疏○胡椒禀天地純陽之氣以生故其味辛氣大溫性雖無毒然辛溫太甚過服未免有害氣味俱厚陽中之陽也入手足陽明經其主下氣溫中去痰除臟腑中風冷者總因腸胃爲寒冷所乘以致臟腑不調痰氣逆上辛

薑桂各少許　同延胡索牡丹皮牛膝當歸地黃芍藥續斷治婦人月候不調煎濃汁加入乳香沒藥血竭自然銅䗪蟲麻皮灰黃荊子等末量病輕重調服四五錢治跌撲損傷如神　胡氏方產後氣喘面黑欲死乃血入肺也用蘇木二兩水二碗煑一碗入人參末五錢服隨時加減神効不可言名參蘇飲

簡誤

食不消或霍亂氣逆心腹冷痛或大腸虛寒完穀不化或寒痰冷積四體如氷兼殺一切魚肉鼈蕈等毒誠爲要品然而血分有熱與夫陰虛發熱咳嗽吐血咽乾口渴熱氣暴衝目昏口臭齒浮鼻衄腸風臟毒痔漏洩澼等證切勿輕餌誤服之能令諸病即時作劇慎之慎之

南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣久

溫煖腸胃而散風冷則痰氣降臟腑和諸證

悉瘳矣

主治叅互

食療治心腹冷痛胡椒三七枚清酒吞之

衛生易簡方夏月冷瀉及霍亂用胡椒碾細

飯丸梧子大每米飲下四十九

簡誤

胡椒辛溫大熱純陽之藥也凡胃冷嘔逆宿

可去脫非其味帶濇則不能止泄非其氣本
涼則不能變白髮者血之餘也顏色者血之
華也血熱則鬢髮早白而顏枯槁脾弱則困
倦嗜臥而氣力不長腎虛則筋骨軟弱而行
步不前入心涼血入脾益氣入腎添精其云
輕身長年令人不饑者非虛語矣凡變白之
藥多是氣味苦寒有妨脾胃惟南燭氣味和
平兼能益脾爲修眞家所須　子味甘酸其

服輕身長年令人不饑變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑿珠袋盛之可適遠方日進一合不饑益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也

疏○南燭禀春升之氣以生本經言其味苦氣平性無毒然甞其味亦多帶微濇其氣平者平即凉也入心脾腎三經之藥十劑云濇

首烏白蒺藜爲烏鬚髮之聖藥　氣味和平

性復無毒除變白外無他用故不著簡誤

橡實味苦微溫無毒主下痢厚腸胃肥健人其

殻爲散及煑汁服亦主痢并堪染用

疏○橡實感天地微陽之氣兼得秋時收歛

之性故其味苦氣微溫性無毒氣薄味厚陽

中陰也入手足陽明足太陰少陰經夫脾胃

爲五臟根本一身之最要喜溫暖而惡寒濕

功効尤勝枝葉眞變白駐顏輕身却老之良

藥也牧童食之輙止饑渴亦一驗矣

主治叅互

孫思邈千金月令方南燭煎益髭髪及容顏

兼補暖三月三日采葉幷蘂子入大净瓶中

以童子小便浸滿瓶固濟其口置閑處經一

周年取開每用一匙溫酒調服極有効驗

同旱蓮草沒食子地黄桑椹枸杞山茱萸何

楮葉炙一兩爲末每服一錢食前烏梅湯調

下　直指方下痢脫肛橡斗子燒存性研末

豬脂和傅

簡誤

濕熱作痢者不宜用

石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋

骨皮毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服

令思男

寒濕則違其性故宜急食苦以燥之此藥味苦能除其所惡氣溫能遂其所喜故主厚腸胃肥健人也得收歛之性故又主下痢及目華子濇腸止瀉諸治兼能濇精養食復能止饑禦歉歲　穀氣味與實相同而濇則過於實故亦主下痢并堪染皂也

主治參互

聖惠方水穀下痢日夜百餘行者橡實二兩

熱散則諸病自瘳女子久服思男者以其補

腎氣助陽火耳

主治參互

同巴戟天肉蓯蓉瑣陽鹿茸枸杞子山茱萸

治腎經虛寒精滑精冷　同白蒺藜桑葉何

首烏淫羊藿巴戟天五加皮兎絲子威靈仙

虎骨治肝腎爲風寒濕所乘以致痺弱不能

行動

疏○石南得火金之氣故其味辛苦氣平有毒然觀其用當是金勝火微其性應云有小毒可升可降陰中陽也入足厥陰足少陰經少陰屬水得金氣之厚者能生水故主養腎氣又腎爲陰中之陰肝爲陰中之陽二經俱在下而主筋骨二經得所養則內傷陰衰自起筋骨皮毛自利而脚弱自健也濕熱之邪畱滯五臟則筋骨皮毛氣血皆爲之病矣邪

所以散結惟溫故所以通行其氣芳香故主入脾其禀火土與金故燥而收歛以其歛攝故治遺精虛漏及小便餘瀝此皆腎氣不固之證也腎主納氣虛則不能納矣又主五液涎乃脾之所統脾腎氣虛二臟失職是腎不能納脾不能攝故主氣逆上浮涎穢泛濫而上溢也歛攝脾腎之氣則逆氣歸元涎穢下行宜東垣用以治客寒犯胃和中益氣及人

簡誤

腎虛而陽道數舉者不宜用腳弱由於肝腎虛而不由於風寒濕客下部者不宜用

益智子味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗

疏○益智子仁得火土金之氣故其味辛其氣溫其性無毒入足太陰足少陰經惟辛故

多服　佐人參茯苓半夏橘皮車前子則攝
涎穢立効　同藿香蘇子橘皮枇杷葉木瓜
止逆氣上壅　同五味子山茱萸炒鹽人參
治小便頻數淋瀝　同人參乾薑橘皮藿香
治因寒犯胃作嘔吐

簡誤

益智乃脾腎二經之藥其用專在脾所以亦
能入腎者辛以潤之之故也然其氣芳香性

多嗜王好古謂益智本脾家藥主君相二火
故用以益脾胃理元氣補腎虛滑瀝劉河間
又謂益智辛熱能開發鬱結使氣宣通皆以
其香可入脾開鬱辛能散結復能潤下於開
通結滯之中復有收斂之義故也

主治叅互

益智在集香丸則入肺在四君子湯則入脾
在大鳳髓丹則入腎當於補藥中兼用不宜

方初陽之氣故其味苦氣平花木色皆紫藏
器言寒無毒入足厥陰經血分寒勝熱苦泄
結紫入營故能活血破血消腫毒下五淋也

花梗氣味功用竝同

主治參互

仙傳外科發背初生一切癰疽皆治單用紫
荆皮爲末酒調箍住自然撮小不開內服柞
木飲子乃救貧良劑也并可內服　楊清叟

本溫熱證屬燥熱病人有火者皆當忌之故凡嘔吐由於熱而不因於寒氣逆由於怒而不由於虛小便餘瀝由於水涸精虧內熱而不由於腎氣虛寒泄瀉由於濕火暴注而不由於氣虛腸滑法竝忌之

紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之

疏○紫荊木皮內禀天地清寒之性外感南

性應無毒氣味俱厚陽中陰也入足厥陰經
其主惡毒風毒者凡毒必因熱而發熱甚則
生風而榮血受傷毒乃生焉此藥鹹能入血
寒能除熱則毒自消矣弘景以之傅金瘡止
血止痛者亦取此意耳宜與番降眞香同爲
極細末傅金瘡良

烏柏木根皮味苦微溫有毒主暴水癥結積聚

疏○烏柏木根皮禀火金之氣以生本經味

仙傳方冲和膏治一切癰疽發背流注諸腫毒用紫荆皮三兩炒獨活炒三兩赤芍藥炒二兩生白朮一兩木蠟炒一兩爲末用葱湯調熱敷血得熱則行葱能散氣也瘡不甚熱者酒調之痛甚者加乳香　除癰毒外他用甚稀故無簡誤

紫眞檀味鹹微寒主惡毒風毒

疏○紫眞檀禀水氣以生故其味鹹氣微寒

簡誤

水腫多屬脾虛不能制水以致水氣泛濫法當補脾實土爲急此藥必不可輕用如果元氣壯實者亦須暫施一二劑病巳卽去之

杉材微溫無毒主療漆瘡

疏○杉材得陽氣而兼金化本經氣微溫無毒日華子加辛氣味芬芳可升可降陽也入足陽明經本經主療漆瘡及蘇恭療脚氣腫

苦氣微溫日華子言凉然詳其用應是辛苦溫之藥而其性則有毒也與巴豆牽牛大略相似性沉而降陽中陰也入手足陽明經其主暴水癥結積聚者皆二經爲病苦能泄辛能散溫能通行腸胃則諸證無不除矣

主治參互

肘後方二便關格二三日則殺人烏桕東南根白皮乾爲末熱水服二錢

霍亂轉筋　柳柳州纂救死三方云元和十
年二月得脚氣夜半痞絶脇有塊大如石且
死困不知人三日家人號哭滎陽陳洵美傳
杉木湯服半食頃大下三行氣通塊散方用
杉木節一大升橘葉切一大升無葉則以皮
代之檳榔七枚童子小便三大升共煑一大
升半分爲兩服若一服得快即停後服此乃
死病會有敎者乃得不死恐人不幸病此故

滿者皆從外治取其芬芳能解滲氣之穢惡
辛溫能散濕毒之衝逆也蘇恭又云服之治
心腹脹痛去惡氣日華子云治霍亂上氣無
非假其下氣散邪辛溫開發之功耳木皮主
金瘡血出及湯火傷灼取老樹皮燒存性研
傅之或入雞子清調敷一二日愈香油亦可

主治參互

同橘皮木瓜香薷砂仁白藊豆石斛治暑月

疏○接骨木禀土氣以生故其味甘苦氣平無毒甘能入脾養血故主折傷續筋骨苦凉能除風濕浮熱故主風癢齲齒也千金方打傷瘀血及產婦惡血一切血不行或行不止竝煑汁服

主治參互

易簡方治折傷筋骨接骨木半兩乳香半錢芍藥當歸川芎自然銅各一兩爲末化黃蠟

傳之　危氏得効方小兒陰腫赤痛日夜啼
叫數日退皮愈而復作用老杉木燒灰入膩
粉清油調傳効　救急方臁瘡黑爛多年老
杉木節燒灰麻油調隔箬葉攤貼縶定數易
即愈　除轉筋脚氣外他用甚稀故不著簡
誤
接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風癢
齲齒可作浴湯

毒瘡宗奭以之治肺風毒皆取其苦凉能散
風邪熱毒之義耳

主治參互

靈苑方乳癰初發腫痛結硬欲破一服即瘥
以北來眞樺皮燒存性研無灰酒服方寸七
卽臥覺卽瘥也　唐瑶經驗方乳癰腐爛靴
內年久樺皮燒灰酒服一錢日一服　和劑
局方肺風毒瘡遍身瘡疥如癘及癮瘮瘙癢

四兩投藥攪勻衆手九如芡實大若止損傷
酒化一丸若碎折筋骨先用此敷貼乃服無
別用故不著簡誤

樺木皮味苦平無毒主諸黃疸濃煑汁飲之良

疏○樺木皮生於西北陰寒之地故其味苦
氣平無毒氣味俱薄降多升少陰也入足陽
明經五疸皆濕熱鬱於陽明所致苦平能除
濕熱故主諸疸也藏器以之治傷寒時行熱

止腰痛除粉刺皯䵟婦人乳癰肛門腫痛

疏〇木鼈子禀火土之氣感長夏暑熱之令以生故其味甘氣溫無毒味厚於氣可升可降陽也爲散血熱除癰毒之要藥夫結腫惡瘡粉刺皯䵟肛門腫痛婦人乳癰等證皆血熱所致折傷則血亦瘀而發熱甘溫能通行經絡則血熱散血熱散則諸證無不瘳矣其止腰痛者蓋指濕熱客於下部所致而非腎

面上風刺婦人粉刺竝用樺皮散主之樺皮
燒灰四兩枳殼去穰燒四兩荊芥穗二兩炙
甘草一兩各爲末杏仁水煑過去皮尖二兩
研如泥研勻每服二錢食後溫酒調下瘡疥
甚者日三服

簡誤

脾胃弱易於作泄者忌之

木鼈子味甘溫無毒主折傷消結腫惡瘡生肌

木鼈子味雖甘而氣則大溫本經雖云無毒然亦未免有毒但宜外用勿輕內服劉績霏雪錄云木鼈子有毒不可食昔薊門有人生二子恣食成痞其父得一方以木鼈子煮猪肉食之其幼子當夜死長子明日死其爲毒雖未如此之厲然亦必非純粹之物也

○番木鼈形小於木鼈而色白味苦氣寒性無毒主傷寒熱病咽喉痺痛消痞塊並含之嚥

虛爲病之比也用者詳之

主治參互

孫用和秘寳方肛門痔痛用木鼈仁三枚砂盆擂如泥入百沸湯一盌乘溫先熏後洗日用三次仍塗少許　聖惠方耳卒熱腫木鼈子仁一兩赤小豆大黃各半兩爲末每以少許生油調塗之

簡誤

悉和平者也爲手少陰足厥陰經要藥少陰主火厥陰主風風火相搏則爲寒熱驚癇此藥氣味甘寒直走二經則風靜火息而肝心寧寒熱驚癇自除矣甄權主小兒驚啼瘈瘲熱壅客忤胎風者亦此意耳

主治參互

得遠志茯神琥珀棗仁丹砂牛黃天竺黃犀角屑生地黃龍齒麥門冬金箔治小兒驚癇

汁醫方摘要治喉痺作痛用番木鼈青木香
山豆根等分爲末吹之

簡誤

番木鼈性大寒味至苦凡病人氣血虛弱脾
胃不實者愼勿用之

鈎藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇

疏○鈎藤禀春氣以生本經氣微寒無毒保
昇言苦甄權言甘平應是甘苦俱不甚氣味

疏○赤檉木禀春陽之氣以生故其色青而葉稍帶微赤凌冬不凋其味甘鹹其氣溫而無毒浮而升陽也入足陽明手太陰少陰經觀本經載其能解驢馬血入肉發毒者蓋以驢馬性熱故多毒生時汗氣沾人即能爲病所以剝時熱血入肉亦能致毒此藥味甘鹹甘得土氣鹹得水氣故能入血解血分之毒也近世又以治痧㾬熱毒不能出用爲發散

瘈瘲有痰加竹瀝南星橘紅　聖濟錄小兒
驚熱鈎藤一兩消石半兩炙甘草二錢五分
爲散每服半錢溫水服日三服　聖惠方卒
得癇疾鈎藤炙甘草各二錢水五合煎二合
每服棗許日五夜三　除小兒驚癇外無他
用故不著簡誤
赤檉木無毒主剝驢馬血入肉毒取以火炙熨
之亦可煑汁浸之

竹葉連翹黃芩甘草之屬治瘢瘮發不出或
雖發不透如熱甚毒熾舌生芒刺大渴譫語
瘢色紫黑者加入三黃石膏湯內大効　單
用及兼各藥竝主瘮瘮首尾諸證　治一切
風不問遠近用赤檉木葉半斤切荊芥半斤
水五升煑二升澄清入白蜜五合竹瀝五合
新瓶盛之油紙封入重湯煑一伏時每服一
小盞日三服　酒多致病長壽仙人柳曬乾

之神藥經曰少陰所至爲瘍瘮正劉守眞所謂諸痛癢瘡瘍皆屬心火之旨也蓋熱毒熾於肺胃則發班瘮於肌肉間以肺主皮毛胃主肌肉也此藥正入肺胃心三經三經毒解則邪透肌膚而內熱自消此皆開發升散甘鹹微溫之功用也

主治參互

同石膏知母薄荷荆芥玄參牛旁子麥門冬

痘瘡數日陷頂漿滯不行或風寒所阻者宜用水楊枝葉無葉用枝五斤流水一大釜煎湯溫浴之如冷添湯良久照見纍起有暈絲者漿行也如不滿再浴之力弱者只洗頭面手足如屢浴不起者氣血敗矣不可再浴始出及痒塌者皆不可浴痘不行漿乃氣滯血濇腠理閉密或風寒外阻而然浴令暖氣透達和暢鬱蒸氣血通徹每隨暖氣而發行漿

爲末每服一錢溫酒下　氣味甘溫性復無

毒除痧瘮外他用甚稀故不著簡誤

水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白擣和水

絞取汁服一升日二大効

疏○水楊葉嫩枝生於涯涘之旁得水土之

陰氣偏多故味苦氣平無毒久痢赤白腸胃

濕熱也得苦涼之氣則濕熱散痢自止令人

又用以治癰腫痘瘡多効魏直博愛心鑑云

冬不凋五月開碎白花不結子木心裏皆白
色本經味苦氣平無毒然其性又善下達主
黃疸病者蓋黃疸因濕熱鬱於腸胃而發此
藥苦能燥濕微寒能除熱兼得下走利竅之
性則濕熱皆從小便出而黃自退矣今世又
以爲治難產催生之要藥亦取其下達利竅
之性耳同魚鰾人參千里馬百草霜牛膝白
芷當歸益母草爲催生聖藥無別用故不著

貫滿功非淺也若內服助氣血藥藉此升之
其効更速直見一嘔在村中用此有驗叩得
其方行之百發百中愼勿易之誠有燮理之
妙也

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸
七

疏〇柞木卽鑿子木處處山中有之葉小而
有細齒光滑而靭其木及葉丫皆有針刺經

凡失血過多內無瘀滯者用之切當與亂髮灰同入更良如暴得吐血瘀滯方動暴得崩中惡露未竭濕熱下痢初發腸風帶下方熾悉不宜遽用即用亦無効入藥須年久敗者良

木槿平無毒止腸風瀉血又止痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用

疏○木槿本經氣平無毒詳其主治應是味

叅互及簡誤

椶櫚皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥燒灰用不可絕過

疏○椶櫚皮禀微陽之氣以生故其味苦濇氣平無毒本經主諸病皆燒灰用者凡血得熱則行得黑灰則止故主鼻洪吐血苦能瀉熱濇可去脫故主崩中帶下及腸風赤白痢也止血固脫之性而能消瘀血故能破癥也

箇半夏五錢剉河水井水各一盌浸六七宿
入輕粉一錢禿筆掃塗覆以青衣數日有臭
涎出妙忌濕浴　簡便方癬瘡有蟲川槿皮
煎入肥皂浸水頻頻擦之或以槿皮浸汁磨
雄黃尤妙

苦氣寒清熱滑利之藥腸風瀉血濕熱留中也痢後作渴餘熱在經津液不足也夜臥少睡心經蘊熱虛煩不寧也苦寒能除諸熱滑利能導積滯故主如上等證今人用治癬瘡多取川中所產肉厚而色紅者彌良花功用相同作湯代茶兼能治風

主治參互

扶壽方牛皮癬川槿皮一兩大風子肉十五

神農本草經疏卷之十五

人部

總二十五種今疏其要者十一種又陳藏器三種

髮髲　亂髮　人乳汁

頭垢　人牙齒　人屎人中黃附

人溺秋石附　溺白垽　婦人月水經衣附

浣褌汁婦人褌襠附

神農本草經疏卷之十四

也故血盛之人則髮潤而黑血枯之人則髮
燥而黃本經用髮髲之意爲是故爾其味苦
氣溫別錄小寒無毒入手足少陰經大人痓
小兒驚癇皆心肝二經血虛而有熱也髮爲
血之餘故能入心入肝益血微寒而苦又能
泄熱所以療小兒驚癇及大人痓也心與小
腸爲表裏腎與膀胱爲表裏心腎有熱則二
腑亦受病此藥能入心除熱入腎益陰則水

懷妊婦人爪甲　天靈蓋

人胞胞衣水附　初生臍帶

髮髲味苦溫小寒無毒主五癃關格不通利小便水道療小兒癇大人痓仍自還神化合鷄子黃煎之消爲水療小兒驚熱雷斆云是男子二十已來無疾患顏色紅白於頂心剪下者入丸藥膏中用先以苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煆赤放冷研用

疏○髮者血之餘也經曰男子八歲腎氣盛齒更髮長是髮因人之血氣以爲生長榮枯

癇止血鼻衄燒之吹內立巳

疏○亂髮即常人頭上墮下者其氣味所主

與髮髲相似第其力稍不及耳以髮髲一時

難得故別錄重出此條以便臨時取用療體

實不甚相遠也

主治參互

和劑局方腸風黑散治腸風瀉血用亂髮一

兩半荊芥二兩槐花槐角各一兩以上共煆

道利五癃關格俱通矣是以古人治驚多用
茯苓琥珀竹葉之類取其分利心經之熱自
小腸出也日華子主止血悶血暈金瘡傷風
及煎膏長肉消瘀血者悉取其入心走肝益
血除熱之功耳自還神化之事未見别方大
抵以火煆之復化而凝成血質此卽自還神
化之謂是因血而生復還爲血非神化而何
○亂髮微溫主欬逆五淋大小便不通小兒驚

研乳汁或酒服少許良　聖惠方鼻血不止
血髮燒灰吹之　又方諸竅出血頭髮敗椶
陳蓮蓬竝燒灰等分每服三錢童便溫酒調
下　婦人良方女人漏血亂髮洗凈燒研空
心溫酒服一錢　入諸膏藥內能消毒止痛
長肉生肌　肘後方女勞黃疸膏髮煎用猪
膏半斤亂髮鷄子大三團和煎髮消藥成矣
分再服病從小便中出也

爲末枳殼甘草各一兩半爲末和前末勻每
服二錢水一盞煎七分空心服溫酒調下亦
得　劉禹錫傳信方孩子熱瘡亂髮一團如
梨子大鷄子黃十箇煮熟同於銚子內熬至
甚乾始有液出旋置盞中液盡爲度用敷瘡
上外卽以苦參粉摻之神効　又方小兒斷
臍卽用清油調髮灰傅之不可傷水臍濕不
乾亦傅之効　千金方小兒驚啼亂油髮燒

未受孕則下爲月水既受孕則留而養胎已產則赤變爲白上爲乳汁此造化玄微之妙人身轉運之神也其味甘氣平無毒入心入腎入脾潤肺益壽延年之聖藥也氣血之液故能補五臟五臟得補則氣血充實而體自肥白悅澤也經曰目得血而能視乳爲血化故能療目赤痛多淚甘能解毒故又主解獨肝牛肉毒也

簡誤
髮灰走血分而帶散其主諸血證亦是血見灰則止取其治標之義居多若欲全仗其補益未必能也經熬煅成末後氣味不佳胃弱者勿服入外科藥殊有神効

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤唐本注療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合豉濃汁飲之神効

疏○人乳乃陰血所化生於脾胃攝於衝任

點數次或以乳浸黃連蒸熱洗之　萬氏家抄方一切虛損勞證太乙神應丸人乳一碗磁器煮乾焙燥牛乳一碗同前製杜仲三兩破故紙二兩半白蘚皮白茯苓牛膝當歸各二兩黍米金丹一箇曬乾卽初生兒口中血珠共爲末蜜丸桐子大每服一丸夜間噙化

簡誤

乳屬陰其性涼而滋潤血虛有熱燥渴枯涸

主治參互

攝生衆妙方接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之證又治中風癱瘓手足疼痛不能動履等證用人乳二盃香甜白者爲佳以好梨汁一盃和匀銀石器内頓滚每日五更一服能消痰補虛生血延壽此以人補人之妙法也　聖惠方眼熱赤腫人乳半合古文錢十文銅器中磨令變色稀稠成煎瓶收日

同山茨菰橘葉鼠糞人爪蒲公英柴胡山豆根白芷連翹貝母夏枯草忍冬藤治乳岩乳癰神効　類要方天行熱病後勞復含頭垢棗核大一枚良　外臺秘要預防勞復傷寒初愈欲令不勞復者頭垢燒研水丸梧子大飲服一丸　衛生寶鑑婦人吹乳百齒霜以無根水丸梧子大每服三丸　數條之外無別用故不著簡誤

者宜之若臟氣虛寒滑泄不禁及胃弱不思
食脾虛不磨食並不宜服
頭垢主淋閉不通 梳上者名百齒霜
疏○頭垢頭上垢膩也其性滑潤而下走故
本經主淋閉不通及弘景療噎疾其味苦溫
能走陽明故又主勞復及婦人吹乳也
主治叅互
同白芷貝母半夏爲丸酒下治婦人吹乳

氣也今世又以之治痘瘡倒靨乳癰未潰爲必須之藥

主治糸互

錢氏小兒方痘瘡倒靨人牙燒存性入麝香少許溫酒服半錢　聞人規痘疹論人牙散治痘瘡方出爲風寒外襲或變黑或青紫此倒靨也宜溫肌發散使熱氣復行而斑自出用人牙不拘多少瓦䥥固濟煆過出火毒研

人牙齒平除勞治瘧蠱毒氣入藥燒用

疏○牙齒者腎之標骨之餘也經云男子三八腎氣平而眞牙生五八腎氣衰而齒槁以腎主骨故也其味甘鹹氣熱有小毒其主除勞治瘧者蓋勞乃勞極精氣之絕腎家虧損所致也齒牙爲腎氣所生以類相從適還其本故主之也瘧亦因勞而發非夏傷暑秋爲瘧之比故亦主之味甘而鹹所以能解蠱毒

近世用人牙治痘瘡陷伏稱爲神品然一槩用之貽害不淺夫齒者腎之標骨之餘也痘瘡則毒自腎出方長之際外爲風寒穢氣所冒腠理閉塞血濇不行毒不能出或變黑倒靨宜用此以酒麝達之竄入腎經發出毒氣使熱令復行而瘡自紅活蓋刦劑也若伏毒在心昏冒不省人事及氣虛色白痒塌不能作膿熱沸紫泡之證止宜解毒補虛苟誤用

末出不快而黑陷者猜猪血調下一錢因誤
服凉藥血濇倒陷者入麝香溫酒服之其效
如神　肘後方乳癰未潰人牙齒燒研酥調
敷之　直指方陰疽不發頭凹沉黯不疼無
熱內服補散不起用人牙燒過穿山甲炙各
一分爲末分作二服用當歸麻黃煎湯下外
以薑汁和麪傅之

時行大熱狂走也凡毒必熱必辛苦寒能除
辛熱故又主解諸毒也蘇恭云新者封疔腫
一日根爛蓋疔腫乃風火之毒氣結成得大
寒極苦之氣則風火散根自爛也今世人又
以之治痘瘡血熱紫黑倒靨者殊効

○糞清臘月截淡竹去青皮塞口納糞坑中積
年得汁甚黑而苦主天行熱狂熱疾中惡蕈
毒惡瘡瘟病垂死者皆瘥一名黃龍湯俗名

此則鬱悶聲啞反成不治之證可不慎哉其

除勞治瘧本經雖言之今世亦稀用

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾

者擣末沸湯沃服之

疏○人之五穀入胃津液上升爲氣血糟粕

下降而成糞其本原以化過但存極苦大寒

之氣味耳入足陽明經經曰陽明實熱則登

高而歌棄衣而走苦寒能除陽明之熱故療

未退再服　寇宗奭衍義大熱狂渴乾陳人
屎爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將
末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久澄清
細細與飲卽解　儒門事親四靈無價散治
痘瘡黑陷腹脹危篤者此爲刼劑用人糞猫
糞猪犬糞等分臘月初旬收埋高燥黃土窖
內至春取出砂罐盛之鹽泥固濟炭火煆令
烟盡爲度取出爲末入麝香少許研勻甆器

金汁

○人中黄即多年厠坑中甕上所凝結黄垽是也藥性治療大約與人屎同解胃家熱毒有効

主治叅互

斗門方熱病發狂奔走似癲如見鬼神久不得汗及不知人事者以人中黄入大罐內以泥固濟煆半日去火毒研末新汲水服三錢

熱鬱滯因而紫黑乾陷倒靨者不宜用以其
若寒之極耳

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良

疏○人溺乃津液之濁者滲入膀胱而出其
味鹹氣寒無毒爲除勞熱骨蒸咳嗽吐血及
婦人產後血暈悶絕之聖藥晉褚澄勞極論
云降火甚速降血甚神飲溲溺百不一死服
涼藥百不一生言其功力之優勝也經云飲

密封收之一歲一字二歲半錢三歲一錢蜜水調下須臾瘡起　千金方疔腫初起刮破以熱屎傅之乾即易　又方五色丹毒黃龍湯飲二合幷塗之良　陶弘景解藥箭毒交廣夷人用焦銅爲箭鏃更以毒藥物汁漬之射人纔傷皮便死惟飲糞汁即解

簡誤

傷寒溫疫非陽明實熱者不宜用痘瘡非火

聲及日華子止勞渴潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血在內暈絕止吐血鼻衄皮膚皴裂難產胞衣不下諸證悉由此故本經主寒熱頭疼溫氣者鹹寒能除邪熱故耳法當熱飲熱則於中尚有眞氣在其行自速冷則惟存鹹味寒性矣

主治參互

同枇杷葉天門冬、麥門冬蘇子桑白皮沙參

入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸
於肺通調水道下輸膀胱故人服小便入胃
亦隨脾之氣上歸於肺下通水道而入膀胱
乃循其舊路也故能治肺病引火下行凡人
精氣清者爲血濁者爲氣濁之清者爲津液
清之濁者爲小便與血同類也故其味鹹而
走血鹹寒能伏虛熱使火不上炎而血不妄
溢是以能療諸血證也蘇恭主久嗽上氣失

孟詵必効方骨蒸發熱童便五升煎取一升
以蜜三匙和之每服二碗半日更服此後常
服自巳小便輕者二十日重者五十日瘥
聖惠方絞腸沙痛童便乘熱服之卽瘥　仲
景方中暑昏悶夏月在途中熱死急移陰處
就掬道上熱土擁臍上作窩令人溺滿煖氣
透臍卽甦乃服地漿蒜水等藥　千金方金
瘡出血不止飲人尿五升　外科發揮折傷

五味子生地黄款冬花百部治陰虛咳嗽聲
啞喉間血腥氣　同蘇木番降香續斷牛膝
牡丹皮蒲黄治内傷吐血或瘀血停留作痛
　同澤蘭荊芥白芷續斷延胡索牛膝蘇木
黑豆治產後血暈虛者加人參　凡產後溫
飲一盃可免血暈至三日後止之　中暍昏
倒以熱小便灌下卽活　聖濟總錄頭痛至
極童便一盞豉心半合同煎至五分溫服

血唾血其効甚速褚澄遺書云人喉有竅則
咳血殺人喉不停物毫髮芥帶必欬血既滲
入愈滲則愈欬愈欬愈滲惟飲溲溺則百不
一死若服寒凉則百不一生其爲肺腎有火
者必須之物第其性稍寒惟不利於脾胃虛
寒或溏泄及陽虛無火食不消者咸在所忌
今世人類用秋石此乃水澄火鍊眞元之氣
盡失其功不逮童便多矣况難多服久服則

跌撲童便入少酒飲之推陳致新其功甚大
千金方火燒悶絕不省人事者新尿頓服
二三升良　通變要法人咬手指瓶盛熱尿
浸一宿即愈　普濟方赤眼腫痛自己小便
乘熱抹洗即閉目少項此以鹹寒內有真氣
故能退去邪熱也
簡誤
人溺滋陰降火除骨蒸解勞乏治諸吐衄咯

降火之驗也

主治參互

同氷片硼砂青黛黃蘗牙硝白礬治口舌生瘡及小兒走馬牙疳口臭　經驗方鼻衄不止人中白焙乾入麝香少許溫酒調服立効

又方小兒口疳人中白煆黃蘗蜜炙焦爲末等分入氷片少許以青布拭淨摻之累効

婦人月水解箭毒并女勞復陳藏器云經衣主金瘡血湧出炙熱

鹹能走血使血凝泣爲病

溺白埊療鼻衄湯火灼瘡

疏○溺白埊即人中白乃人溺之積氣結成

其味鹹氣凉無毒能瀉肝腎三焦膀胱有餘

之火本經療鼻衄及大明治傳屍勞熱肺痿

心膈熱吐血羸瘦渴疾者以其能入諸經瀉

去火邪也凉能除熱故又治湯火灼瘡令人

以之治口舌生瘡疳䘌等證多効是其除熱

復損故有是證月水乃陰中有陽之物能補
陰除熱故主之也金瘡及虎狼傷瘡皆血分
受傷爲病以類相從乃所以補其不足也童
女首經名紅鉛能回垂絕之陽氣第一時難
得耳如女子自受胎時筭至十四歲足卽於
是日是時經至者此爲正鼎其經爲上藥用
法招攝於經將至時眞氣先到采入身中名
得大藥可以接命卽首楞經所載精仙是也

熨之又燒灰傅虎狼傷瘡及箭鏃毒入腹

疏○經云女子二七天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下謂之天癸者乃天一所生之水也上應太陰下應海潮月有盈虧潮有朝汐故月事一月一行與之相符也其味鹹鹹爲水化凡毒得水則解故能解箭毒也女勞復者熱病新瘥後交感而得其證發熱煩躁少腹陰囊牽引而痛以前病餘熱未除陰精

夷人以焦銅和毒藥於箭鏃上中人卽沸爛須臾骨壞而死但服月水屎汁解之

簡誤

月水雖能治病然穢汚不潔之物故女子入月時人宜遠之其昇丹煎膏治藥及小兒出痘切須避忌如犯之則藥不靈痘變壞也紅鉛其性質乃陽氣凝結而成火盛人不宜單服須多服人乳幷入童溺乃佳

絕非入爐交感亦非情想得通故亦成仙道
耳
主治叅互
扁鵲方丈夫熱病後交接復發忽卵縮入腹
腹痛欲死燒女人月經赤衣爲末熱水服方
寸七郎定幷治女勞色疸　千金方男子陰
瘡因不忌月事行房陰物潰爛用室女血衲
瓦上燒存性研末麻油調傅　博物志交廣

主治叅互

仲景方陰陽易病身體重少氣腹裏急或引陰中拘急熱上衝胷頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒褌散主之取中褌近陰處燒灰水服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈男用女女用男　千金方胞衣不下以本婦褌覆井上即下

懷妊婦人爪甲取細末置目中去瞖障

浣褌汁解箭毒并女勞復亦善　婦人褌襠主
陰昜病當陰上割取燒末服方寸匕童女褌益
佳若女患陽昜卽須男子褌也陰昜病者人患
時行病起後交合陰陽便卽相著甚於本病其
候小便赤濇寒熱甚頭痛腰痛耳鳴眼花服此
便通利
疏〇褌襠居下體得陰氣勝取其以類相從
氣相感能導邪熱故主陰陽昜病也

用

主治參互

聖惠方胞衣不下取本婦手足爪甲燒灰酒

服　又方一切目疾以木賊草擦取爪甲末

同丹砂等分研勻以露水搜丸芥子大每以

一粒點入目內或用乳汁和亦得幷治飛絲

入目

大靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久

疏○爪者筋之餘肝膽之外候也經曰多食
辛則筋急而爪枯以辛能散眞氣而走筋也
本經獨用懷妊婦人者蓋婦人氣血充實乃
能受孕取其有生長力緊之意也其味甘鹹
氣平無毒目中瞖障肝經血虛也爪甲乃肝
之餘氣所生而性又帶散故點目能去瞖障
也寇宗奭以衆人甲刮取細末搐鼻內治鼻
衄立愈兼能催生利小便止尿血散乳癰等

亦主之

主治參互

同鬼臼乾漆象膽獺肝丹砂胡黄連入滋陰

藥內治傳尸勞　同牛黄象牙末蛀竹屑血

竭乳香沒藥黄蠟明礬眞珠作丸治楊梅結

毒　痘瘡經驗方痘瘡陷伏灰平不長此係

虛寒證用天靈蓋燒研酒服三分

○附化屍塲上人骨取爲細末傅金瘡止血長

瘴勞瘧寒熱無時者燒令黑細研白飲和服亦

合九散用

疏○天靈蓋乃死人腦蓋骨也不用他骨而

用此者以人生時腦爲諸陽之會而此骨則

一身衆骨之主也其主傳尸尸疰鬼氣伏連

者取其同類之氣引出邪魅則其魂魄飛越

不復附人故得瘥也久瘴勞瘧寒熱無時者

亦邪惡之氣侵人也辟惡散邪是其能事故

散其邪以發出耳非正治也若血熱煩躁瘡
乾紫黑者用之必致危殆不救慎之慎之
人胞主血氣羸瘦婦人勞損面䵟皮黑腹內諸
病漸瘦瘁者以五味和之如䭔餌法與食之勿
令知一名紫河車
疏○夫人有生之初攬父精母血以成胚胎
外即有衣一層裹之即胞也至十月降生時
隨兒後出其味甘鹹氣溫無毒血氣羸瘦婦

肉及惡瘡不收歛并能治打撲折傷人受杖

時服之不痛不腫不爛

簡誤

天靈蓋治勞瘵者以其有尸鬼勞蟲爲害取

其逐散邪也今人虛損勞怯皆係色欲過度

損傷眞陰實無鬼氣淹伏何得用此幽暗不

祥之物治之哉其痘瘡虛寒陷伏或爲邪氣

所觸發不出者不過借其陽氣所結之餘逐

調小產難產服之必主有子危疾將絕者一二服可更活一二日其補氣血之功力可見也久服耳目聰明鬚髮烏黑延年益壽有奪造化之功故名大造丸用紫河車一具男用女胎女用男胎初生者米泔洗淨淡酒蒸熟搗曬研末敗龜板童便浸三日酥炙黃二兩黃檗杜仲各一兩半牛膝一兩二錢生地黃二兩半入砂仁六錢白茯苓二兩絹袋盛入

人勞損面䵟皮黑腹內諸病漸瘦瘁者皆榮
血不足精氣虧損也此藥得精血之氣而結
能從其類以補之是以主諸證也今世以之
治男女一切虛損勞極爲益血補精氣之用

主治叅互

同人參黃耆鹿茸白膠當歸補骨脂五味子
巴戟天治眞陽虛極畏寒足冷　吴球大造
丸治虛勞骨蒸女人無子及多生女月水不

女坎離之氣而成如陰陽兩虛者服之有反本還元之功誠爲要藥也然而陰虛精涸水不制火發爲咳嗽吐血骨蒸盜汗等證此屬陽盛陰虛法當壯水之主以制陽光不宜服此並補之劑以耗將竭之陰也胃火齒痛法亦忌之

○胞衣水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮竪虛痞等證

瓩罐酒煮七次去茯苓砂仁不用杵地黃爲
膏聽用天門冬麥門冬人參各一兩二錢淨
夏月加五味子七錢俱忌鐵器爲細末地黃
膏加酒米糊丸小豆大每服八九十丸空心
鹽湯下女人去龜板加當歸二兩男子遺精
女人漏下並加牡蠣粉一兩去人參

簡誤

人胞乃補陰陽兩虛之藥以其形質亦得男

妙從此而通胎出母腹臍帶剪斷則一點眞
元之氣從此而歸入命門丹田故臍爲命蔕
而臍帶亦眞氣會聚之所也本經以之治瘧
者應是久瘧虛寒之甚藉其氣以補不足也
今世以小兒脫下臍帶燒灰與服可解胎中
一切毒及免驚風痘患亦取裨補眞元耳
主治叅互
全幼心鑑臍汁不乾綿裹落下臍帶燒研一

天行熱病飲之立効此卽胞衣埋地下久遠化爲水者得地中之陰氣其氣必寒辛寒而走足陽明經故主如上諸證也南人以甘草升麻和入胞瓶盛埋之三五年後掘出取爲藥也

初生臍帶主瘧燒爲灰飲下之

疏○臍者命蔕也當心腎之中爲眞元歸宿之處胎在母腹臍連於胞喘息呼吸滋養之

神農本草經疏卷之十六

獸部上品

總二十種今疏其要者十種

龍骨 齒附　麝香　牛黃

熊脂 膽掌附　象牙 膽皮附　白膠

阿膠　牛乳　酥

乳腐

龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅

錢入當歸頭末一錢麝香一字摻之　保幼

大全預解胎毒臍帶燒灰以乳汁調服或入

辰砂少許可免痘患無毒而主療甚稀不著

簡誤

疏○龍禀陽氣以生而伏於陰爲東方之神乃陰中之陽鱗蟲之長神靈之物也故其骨味甘平氣微寒無毒內應乎肝入足厥陰少陽少陰兼入手少陰陽明經神也者兩精相合陰陽不測之謂也神則靈靈則能辟邪惡蠱毒魘魅之氣及心腹鬼疰精物老魅遇之則散也欬逆者陽虛而氣不歸元也氣得歛攝而歸元則欬逆自止其性濇以止脫故能

欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣
驚癇療心腹煩滿四肢枯痿汗出夜臥自驚恚
怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗
縮小便溺血養精神定魂魄安五藏　白龍骨
療夢寐洩精小便洩精　齒主小兒大人驚癇
癲疾狂走心下結氣不能喘息諸痙殺精物小
兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒熱又
殺蠱毒得牛黃人參良畏石膏忌魚及鐵

則神魂自安氣得歸元升降利而喘息自平
汗自止也肝主怒肝氣獨盛則善恚怒魂返
乎肝則恚怒自除小腸爲心之腑膀胱爲腎
之腑二經之氣虛脫則小便多而不禁臟氣
歛則腑亦隨之故能縮小便及止夢寐洩精
小便洩精兼主溺血也其主養精神定魂魄
安五臟者乃收攝神魂閉濇精氣之極功也
又主癥瘕堅結腸癰內疽陰蝕者以其能引

止洩痢膿血因於大腸虛而久不得止及女
子漏下也小兒心肝二臟虛則發熱熱則發
驚癇驚氣入腹則心腹煩滿歛攝二經之神
氣而平之以清其熱則熱氣散而驚癇及心
腹煩滿皆自除也肝氣賊脾脾主四肢故四
肢痿枯肝寧則熱退而脾亦獲安故主之也
汗者心之液也心氣不收則汗出肝心腎三
經虛則神魂不安而自驚收歛三經之神氣

煑一伏時曬乾用否則着人腸胃晚年作熱也

主治參互

仲景方同牡蠣入柴胡桂枝各湯內取其收斂浮越之正氣固脫而鎭驚　同遠志等分爲末煉蜜丸如梧子大硃砂爲衣每服三十丸蓮心湯下治勞心夢遺　梅師方曬即洩精白龍骨四分韭子五合爲散空心酒服方

所治之藥黏着於所患之處也　按龍骨入心腎腸胃龍齒單入肝心故骨兼有止瀉濇精之用齒惟鎮驚安魂魄而巳凡用龍骨先煎香草湯洗二度擣粉絹袋盛之用燕子一隻去腸肚安袋於內懸井上面一宿取出研粉入補腎藥中其効如神又法酒浸一宿焙乾研粉水飛三度用如急用以酒煑焙乾或云凡入藥須水飛過曬乾每觔用黑豆一斗

蘇合香治大人小兒驚癇癲疾

簡誤

龍骨味濇而主收歛凡洩痢腸澼及女子漏
下崩中溺血等證皆血熱積滯爲患法當通
利疎泄不可便用止濇之劑恐積滯瘀血在
內反能爲害也惟久病虛脫者不在所忌

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱
毒癇痓去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛

寸七　又方泄瀉不止白龍骨白石脂等分
爲末水丸梧子大紫蘇木瓜湯下量大人小
兒用亦治久痢休息　姚和衆方久痢脫肛
白龍骨粉撲之　龍齒同荊芥澤蘭牡丹皮
蘇木人參牛膝紅花蒲黃當歸童便治產後
惡血撲心妄語顚狂如傷寒發狂者切不可
認作傷寒治誤則殺人　同牛黃犀角鈎藤
鈎丹砂生地黃茯神琥珀金箔竹瀝天竹黃

結成是香或遇蛇亦噉但不結香耳如必噉
蛇多而後有香則此藥必大毒難近之物安
得味辛氣溫無毒耶甄權言苦辛其香芳烈
爲通關利竅之上藥凡邪氣着人淹伏不起
則關竅閉塞辛香走竄自內達外則毫毛骨
節俱開邪從此而出故主辟惡氣殺鬼精物
凶邪蠱毒溫瘧中惡心腹暴痛脹急痞滿風
毒諸證也其主癇痓者借其氣以達於病所

脹急痞滿風毒婦人難產墮胎去面䵟音孕目中
膚瞖久服除邪不夢寤魘寐通神仙忌大蒜
疏〇陶弘景云麝常食柏葉又噉蛇予以爲
其香必非因噉蛇而結蘇頌乃云夏月食蛇
多至寒則香滿入春臍內急痛自以爪剔出
陶云五月得香往往有蛇皮骨豈有食蛇逾
一年而皮骨尚不化者乎不知麝乃山獸好
食香木芳草如栢葉之類故其氣聚於臍而

骨之功耳

主治參互

同犀角牛黃琥珀龍齒遠志丹砂鉛丹金箔菖蒲眞珠茯神天竺黃治心氣虛怯驚邪癲癇或夢寐紛紜鬼交鬼疰及小兒急驚大人中惡等證　同白及白斂紅白藥子雄黃烏雞骨煅乳香沒藥氷片爲末傳一切癰疽疔腫有神　濟生方中風不省麝香二錢研末

也苦辛能殺蟲故主去三蟲辛溫主散故能
去面䵟及目中膚翳性能開竅故主難產墮
胎也走竄之性而云久服除邪不夢寤魘寐
通神仙者凡香皆能辟除惡氣而通神明故
有是功能也日華子云納子宮煖水臟止冷
帶疾藥性論主小兒驚癇客忤蝕一切癰疽
膿水今人又用以治中風中氣中惡痰厥猝
仆兼入膏藥傅藥皆取其通竅開經絡透肌

香封之妙并治蠶咬成瘡

簡誤

麝香走竄飛揚內透骨竅臟腑外徹皮肉及筋其性能射故善穿透開散東垣云凡風病在骨髓者用之使風邪得出若在肌肉用之反引風入骨丹溪云五臟之風不可用麝香以瀉衞氣二公之言誠得其旨矣凡似中風小兒慢脾風與夫陰陽虛竭發熱吐血盜汗

入清油二兩和勻灌之卽甦　又方食諸果
成積傷脾作脹氣急用麝香一錢生桂末一
兩飯和丸菉豆大大人十五丸小兒七丸白
湯下蓋果得麝卽落木得桂卽枯故也　夏
子益奇疾方口內肉毬根如線五寸餘如釵
股吐出乃能食物捻之則痛徹心者麝香一
錢研水服之日三自消　續千金方催生易
產麝香一錢水研服　經驗方鼠咬成瘡麝

牛黃味苦平有小毒主驚癎寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼療小兒百病諸癎熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘（人參爲之使惡常山畏牛膝乾漆）

疏○牛爲土畜其性甘平惟食百草其精華凝結爲黃猶人身之有內丹也故能解百毒而消痰熱散心火而療驚癎爲世神物諸藥莫及也凡牛生黃則夜視其身有光皮毛潤

自汗氣虛眩暈氣虛痰熱血虛瘦弱血虛目
翳心虛驚悸肝虛癇痙產后血暈胎前氣厥
諸證之屬於虛者法當補益槩勿施用卽如
不得已欲借其開通關竅於一時亦宜少少
用之勿令過劑甦省開通之後不可復用矣
孕婦不宜佩帶勞怯人亦忌之李廷飛云不
可近鼻有白蟲入腦患癩久帶其香透關令
人成異疾

火息神魂清諸證自瘳矣鬼邪侵着因心虛
所致小兒百病多屬胎熱入心養神除熱解
毒故悉主之也性善通竅故能墮胎善除熱
益心故能令人不忘非久服多服之藥其云
輕身延年者蓋指病去則身自輕安而得盡
其天年也

主治參互

同犀角琥珀天竺黃釣籐鈎茯神真珠金箔

澤眼如血色蓋得氣之精而形質變化自有異也或云牛病乃生黃者非也本經味苦氣平別錄有小毒吳普云無毒然必無毒者爲是入足厥陰少陽手少陰經其主小兒驚癇寒熱熱盛口不能開及大人癲狂癇痓者皆肝心二經邪熱膠痰爲病心熱則火自生焰肝熱則木自生風風火相搏故發如上等證此藥味苦氣涼入二經而能除熱消痰則風

一日令盡　外臺秘要小兒七日口噤牛黃
爲末以淡竹瀝化一字灌之更以猪乳滴之
錢氏小兒方初生胎熱或身體黃者以眞
牛黃一豆大入蜜調膏乳汁化開時時滴兒
口中兼治腹痛夜啼　總微錄小兒熱驚或
驚癎嚼舌迷悶仰目牛黃一杏仁大竹瀝薑
汁各一合和勻與服　又方小兒積熱毛焦
睡語欲發驚者牛黃六分硃砂五錢同研以

麝香丹砂治小兒驚癇百病　入外科內服藥能解疔腫癰疽毒并可入傳藥止痛散毒如神　同犀角生地黃牡丹皮竹葉麥門冬治小兒五色丹毒　同鍾乳石眞珠猪牙皂角象牙末白殭蠶紅鉛片腦明礬沒藥蛀竹屑天靈蓋爲九土茯苓湯下治結毒有神

姚和衆方小兒初生三日去驚邪辟惡氣以牛黃一豆許以蜜少許研勻綿蘸令兒吮之

熊脂味甘微寒微溫無毒主風痹不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白秃面皯皰食飲吐嘔久服強志不饑輕身長年

疏○詩云惟熊惟羆男子之祥取其爲陽獸而強力壯毅也本經味甘氣微寒别錄微溫無毒其主風痹不仁筋急者蓋風爲陽邪熊爲陽獸其氣溫能通行經絡其性潤能滋養肝脾故主之也滑澤而通行故主五藏腹中

犀角磨汁調服一錢　王氏痘疹方痘瘡黑陷牛黃二粒朱砂一分研末蜜浸臙脂取汁調搽并可內服

簡誤

牛黃治小兒百病之聖藥蓋小兒稟純陽之氣其病皆胎毒痰熱所生肝心二經所發此藥能化痰除熱清心養肝有起死回生之力惟傷乳作瀉脾胃虛寒者不當用

疏○熊膽氣味與象膽同其所主亦相似時
氣熱盛變爲黃疸熱邪在足太陰也久痢疳
𧏾濕熱在手陽明也心痛疰忤熱邪在手少
陰也入三經而除熱邪故能療諸證也極苦
而寒故又能殺蟲治惡瘡點痔

主治參互

齊東野語赤目障翳熊膽丸以膽少許化開
入片腦一二釐研勻點上絕妙　聖惠方小

積聚及食飲吐嘔甘寒而強力故能主寒熱
羸瘦輕身性潤而疎風故能主頭瘍白禿面
皯皰也久服強志不饑長年甚言其補虛壯
筋骨之功耳熊掌乃八珍之一食之可禦風
寒益氣力肉與脂同功河間云熊肉振羸是
因其氣有餘以補不足者也

○熊膽味苦寒無毒療時氣熱盛變爲黃疸暑
月久痢疳䘌心痛疰忤藥性論小兒五
疳殺蟲治惡瘡

障者以肝脾二臟邪熱壅滯則二臟之氣血
日虛閉塞日甚故也用此瀉肝膽脾家之熱
則內邪清而外障去矣如不因痡證而目生
翳障及痘後蒙閉者多因肝腎兩虛宜滋陰
養血清熱爲急諸膽皆不得用有痼疾者不
可食熊肉令終身不愈

象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和
水傅瘡上立出

兒鼻蝕熊膽半分湯化抹之　外臺秘要十
年痔瘡熊膽塗之神効一切方不及也或加
入片腦少許以猪膽汁和塗亦妙　保幼大
全諸疳羸瘦熊膽使君子末等分研勻瓷器
蒸溶蒸餅丸麻子大每米飲下二十丸

簡誤

凡膽皆極苦寒而能走肝膽二經瀉有餘之
熱蓋以類相從也小兒疳積多致目內生翳

牛黃條內　王氏痘瘮方痘瘮不收象牙屑
銅銚炒黃紅色爲末每服七八分白湯下
又方鍼箭入肉象牙末水和傅之即出也
日華子治小便不通象牙生煎服之小便過
多燒灰飲下
○象膽主明目及治疳治瘡腫以水化塗之治
口臭以綿裹少許貼牙根平旦漱去數度即
瘥

疏○象牙本經無氣味日華子云平海藥云
寒應是甘寒無毒之物象性勇猛而牙善蛻
故能出一切皮肉間有形滯物如經所言也
又能治邪魅驚悸風癇及惡瘡拔毒長肉生
肌去漏管等用

主治參互

同明礬黃蠟牛角䚡鉛花金頭蜈蚣蝟皮猪
懸蹄治通腸漏能去漏管　治楊梅結毒藏

滋腎藥內治傳尸癆瘵　聖濟總錄內障目

翳用象膽半兩鯉魚膽七枚熊膽一分牛膽

半兩麝香一分石決明一兩爲末糊丸菉豆

大每茶下十丸日二

○象皮其性最易收斂人以鈎刺插入皮中拔

出半日其瘡卽合故入膏散爲長肉合金瘡

之要藥

簡誤

疏○象膽苦寒之物也入肝脾二經肝熱則目不明脾家鬱熱則成疳積或口臭苦寒除二經之熱故能主諸證苦寒凉血解毒故又能主瘡腫也今世治疳證癆瘵傳屍多用之總取其苦寒能殺疳蟲癆蟲兼除臟腑一切熱結也

主治叅互

同獺肝蘆會乾漆胡黃連青黛鬼臼丹砂入

錄溫無毒氣薄味厚降多升少陽中之陰也入足厥陰少陰手少陰厥陰經經曰勞則喘且汗出內外皆越中氣耗矣故凡作勞之人中氣傷絕四肢作痛多汗或吐血下血皆肝心受病此藥味甘氣溫入二經而能補益中氣則絕傷和四肢利血自止汗自歛也折跌傷損則血瘀而成病甘溫入血通行又兼補益故折跌傷損自愈婦人血閉無子及崩中

象膽苦寒之極不利脾胃凡痟證脾弱者目病血虛者咸不宜多服象牙及皮氣味和平於臟腑無迕故不著簡誤

白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折跌傷損久服輕身延年一名鹿角膠得火良畏大黃

疏○白膠是熬鹿角而成故其味甘氣平別

萸枸杞子鹿茸地黃麥冬杜仲補骨脂懷山藥車前子五味子巴戟天蓮鬚治腎虛陽痿精寒無子加入當歸紫石英治婦人血閉子宮冷服之受孕　外臺秘要虛勞尿精及尿血白膠二兩炙酒二升頓和溫服　肘后方妊娠卒下血以酒煑膠二兩消盡頓服

簡誤

鹿乃仙獸純陽之物也其治勞傷羸瘦益腎

淋露胎痛不安腰痛羸瘦者皆血虚肝腎不足之候溫肝補腎益血則諸證自退而胎自得所養也血氣生眞陽足故久服能輕身延年耳更治尿血溺精瘀瘍腫毒及漏下赤白婦人久服能令有子

主治參互

同牛膝牡丹皮麥門冬地黃眞蘇子鬱金白芍藥當歸童便續斷治勞傷吐血　同山茱

肝氣久服輕身益氣一名傅致膠得火良薯蕷為之使畏大黃凡用以蛤粉炒或酒化成膏亦得

疏〇阿膠舊云煑牛皮作之藏器與蘇頌皆云是烏驢皮其說為的其功專在於水按阿井在山東兖州府東阿縣乃濟水之伏者所注其水清而重其色正綠其性趨下而純陰與衆水大别本經味甘氣平別錄微溫無毒元素云性平味淡氣味俱薄可升可降陽中

添精煖腰膝養血脉強筋骨助陽道之聖藥
也然而腎虛有火者不宜用以其偏於補陽
也上焦有痰熱及胃家有火者不宜用以其
性熱復臓滯難化也凡吐血下血係陰虛火
熾者槩不得服
阿膠味甘平微溫無毒主心腹内崩勞極洒洒
如瘧狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫
小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養

血故能養肝氣入肺腎補不足故又能益氣
以肺主氣腎納氣也氣血兩足所以能輕身
也今世以之療吐血衂血血淋尿血腸風下
血血痢女子血氣痛血枯崩中帶下胎前產
後諸疾及虛勞咳嗽肺痿肺癰膿血雜出等
證神効者皆取其入肺入腎益陰滋水補血
清熱之功也

主治參互

陰也入手太陰足少陰厥陰經其主女子下血腹內崩勞極洒洒如瘧狀腰腹痛四肢酸疼胎不安及丈夫少腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立等證皆由於精血虛肝腎不足法當補肝益血經曰精不足者補之以味味者陰也補精以陰求其屬也此藥得水氣之陰具補陰之味俾入二經而得所養故能療如上諸證也血虛則肝無以養益陰補

景方黃連阿膠湯治少陰病得之二三日以上心中煩不得臥者用阿膠三兩黃連四兩黃芩一兩芍藥二兩雞子黃二枚以水五升先煑三物取二升去滓內膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三　和劑局方治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白裏急後重腹痛小便不利用阿膠二兩炒黃連三兩茯苓二兩為末擣丸梧子大每服五十丸米湯

同天麥門冬栝樓根白藥子五味子桑白皮剪草生地黄枸杞子百部蘇子白芍藥治肺腎俱虛咳嗽吐血　同杜仲枸杞子白芍藥山藥麥門冬地黄黄耆人參青蒿續斷黄檗治婦人崩中漏血　同白芍藥炙甘草麥冬地黄白膠當歸枸杞子杜仲續斷治婦人胎痛或胎漏下血　直指方老人虛秘阿膠炒二錢葱白三根水煎化入蜜二匙溫服　仲

其氣濁穢不堪入藥當以光如瑩漆色帶油
綠者爲眞眞者折之卽斷亦不作臭氣夏月
亦不甚溼軟如入調經丸藥中宜入醋重湯
頓化和藥其氣味雖和平然性黏膩胃弱作
嘔吐者勿服脾虛食不消者亦忌之

牛乳微寒補虛羸止渴

乳腐味甘微寒無毒主潤五藏利大小便益十
二經脉

下日三　千金翼吐血不止阿膠炒二兩蒲
黃六合生地黃三兩水五升煑三升分服兼
治衂血　梅師方妊娠下血不止阿膠三兩
炙爲末酒一升煎化服卽愈　產寶方膠艾
湯妊娠胎動阿膠艾葉各二兩葱白一升水
四升煑一升分服
簡誤
此藥多僞造皆雜以牛馬皮舊革鞍靴之類

夏子益奇疾方肉人惟病人頂生瘡五色如
櫻桃狀破則自頂分裂連皮剝脫至足名曰
肉人常飲牛乳自消

簡誤

患冷氣人忌之與酸物相反令人腹中癥結
脾胃作泄者亦不得服

酥微寒補五藏利大腸主口瘡

疏○酥乃牛乳所出乳之精華也其味甘氣

疏○牛乳乃牛之血液所化其味甘其氣微寒無毒甘寒能養血脉滋潤五藏故主補虛羸止渴及乳腐所主皆同也月華子主養心肺解熱毒潤皮膚者亦此意耳肝味苦甘氣和平食之能補肝治雀盲

主治參互

同人乳羊乳梨汁蘆根汁蔗漿熬膏治反胃噎膈大便燥結宜時時飲之兼能止消渴

補血脉又有滲入骨肉使骨易糜之功　外臺秘要一切肺病咳嗽膿血不止用好酥五十斤煉三遍當出醍醐每服一合日三服以瘥爲度神効

簡誤

性能利竅驟食之使人遺精

微寒無毒性滑澤五臟皆屬陰酥乃陰血之精華故能補五藏血枯火盛大腸燥結及口舌生瘡甘寒除熱補血故主利大腸口瘡也

按酥酪醍醐總成於牛乳但有精粗之别耳其性大抵皆滋潤滑澤宜於血熱枯燥之人其功不甚相遠故二物不復載

主治叅互

凡一切藥用酥炙者取其潤燥兼能益精髓

獸部中品

總十七種今疏其要者九種

白馬莖 屎溺附　鹿茸 角髓腎肉附　牛角鰓 膽肉附

羖羊角 肝腎肉血附　狗陰莖 頭骨血肉

附 羚羊角　犀角

虎骨　兔頭骨 腦肝肉附

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絕陰不起强

神農本草經疏卷之十六

能令人有子也氣屬陽陽得補故能益氣腎藏志腎氣足故能強志甘溫補血脉而助眞氣故又能長肌肉肥健也別錄又主小兒驚癇者似非其所長應是誤入耳凡収當取銀色無病白馬春月游牧時力勢正強者生取陰乾百日用時以銅刀切片將生羊血拌蒸半日去血晒乾剉用

主治參互

志益氣長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日
用

疏○馬火畜也其陰莖又純陽之物也故能
主男子陰痿堅強房中藥多用之本經味鹹
氣平别錄甘無毒察其功用氣平應作溫非
甘溫則不主傷中脉絕以甘能補血脉溫能
通經絡故耳陽衰則陰不起而生長之道絕
鹹溫走下焦補助眞陽則陰自起精自煖故

○馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衂金瘡止血

疏○白馬通本經雖云微溫然必是苦而涼者也惟其苦涼所以能療諸血熱證止渴及孟詵主陰陽易垂死者絞汁服也

○白馬溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器盛飲之

疏○白馬溺昔有人與其奴皆患心腹痛病

得肉蓯蓉巴戟天山茱萸兎絲子真陽起石人參鹿茸狗陰莖作丸治真陽虗脫陰痿不起下元冷憊等證

簡誤

馬陰莖乃純陽之物也凡陰虗火盛者不得服人但喜其溫煖滋助陽道少年多慾者房中術用之仗其力勢恣欲無節以致損竭真陰多成勞瘵不可不戒也

主治參互

千金方食髮成瘕咽中如有蟲上下者白馬尿飲之佳　鮑氏方利骨取牙白馬尿浸茄秤三日炒爲末點牙卽落

簡誤

無積聚癥瘕者不得服胸中虛痞誤作伏梁服之有損

鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚

奴死剖之得一白鼈赤眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘白馬觀之馬尿墮鼈而鼈縮遂以灌之即化成水其人乃服之疾亦愈觀其氣味不應有如是之功乃知物性畏忌各有所制如刀柄之刈三稜而化爲水正以遇其所制之物故也本經云氣微寒然詳其用必是微溫味應帶鹹辛鹹溫具足所以能

療經所言諸證

男子肝腎不足則爲寒熱驚癎或虛勞洒洒
如瘧或羸瘦四肢酸疼腰脊痛或小便數利
洩精溺血此藥走命門心包絡及腎肝之陰
分補下元眞陽故能主如上諸證及益氣強
志生齒不老也癰腫疽瘍皆榮氣不從所致
甘溫能通血脉和腠理故亦主之日華子主
補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精溢
自出女人崩中漏血赤白帶下炙末空心酒

癇益氣強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破畱血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢癢應作瘍○凡用取形如分岐馬鞍茸端如瑪瑙紅玉破之肌如朽木者最良先以酥薄塗勻於烈炎中燎去毛再炙

疏○鹿茸稟純陽之質含生發之氣故其味甘氣溫別錄言酸微溫氣薄味厚陰中之陽也入手厥陰少陰足少陰厥陰經婦人衝任脈虛則爲漏下惡血或瘀血在腹或爲石淋

心酒下五十丸昔西蜀市中有一道人貨之
一名茸珠丹每醉高歌曰尾閭不禁滄海竭
九轉靈丹都漫說惟有班龍頂上珠能補玉
堂闗下穴朝野遍傳之卽此方也　普濟方
鹿茸酒治陽事虛痿小便頻數面色無光用
嫩鹿茸一兩去毛切片山藥末一兩絹袋褁
置酒甕中七日後開甕日飲三盃將茸焙乾
作丸服　本事方陰虛腰痛不能反側鹿茸

服方寸七

主治參互

同牛膝杜仲地黄山茱萸補骨脂巴戟天山

藥肉蓯蓉兎絲子治腎虚腰痛及陰痿不起

瀍寮方班龍丸治諸虚用鹿茸酥炙鹿角

膠炒成珠鹿角霜陽起石煅紅醋淬肉蓯容

酒浸酸棗仁柏子仁黄耆各一兩地黄九蒸

八錢朱砂半錢各爲末酒糊丸梧子大每空

氣杜仲爲之使

疏○鹿山獸屬陽夏至解角者陰生陽退之象也麋澤獸屬陰冬至解角者陽生陰退之象也是以麋茸補陰鹿茸補陽角亦如之凡角初生軟嫩者爲茸稟壯健之性故能峻補腎家眞陽之氣㸐成白膠則氣味甘緩能通周身之血脉生角則味鹹氣溫惟散熱行血消腫辟惡氣而已鹹能入血軟堅溫能通行

兎絲子各一兩茴香半兩爲末以羊腎二對
和酒煑爛搗如泥和丸梧子大陰乾每服三
五十丸酒下日三服　濟生方室女白帶因
衝任虛寒者鹿茸酒蒸焙二兩金毛狗脊白
歛各一兩爲末用艾煎醋打米糊丸梧子大
每酒下五十丸日二服　簡誤同白膠
〇鹿角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣畱血
在陰中除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血益

女子胞中餘血不盡欲死者悉取其入血行
血散熱消腫補陽辟邪之意也
主治參互
濟生方骨虛勞極面腫垢黑脊痛不能久立
血氣衰憊髮落齒槁甚則喜唾用鹿角屑二
兩牛膝一兩半爲末煉蜜丸梧子大每服五
十丸空心鹽湯下　肘後方腎虛腰痛如錐
刺不能動搖鹿角屑三兩炒黃研末空心溫

散邪故主惡瘡癰腫逐邪惡氣及留血在陰
中少腹血急痛折傷惡血等證也肝腎虛則
爲腰脊痛鹹溫入腎補肝故主腰脊痛氣屬
陽補陽故又能益氣也日華子云水磨服治
脫精尿血夜夢鬼交醋磨汁塗瘡瘍癰腫熱
毒火灸熱熨小兒重舌鵝口瘡孟詵云銼灸
研末酒服輕身強骨髓補陽道絕傷又治婦
人夢與鬼交者酒服一撮卽出鬼精燒灰治

○髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒和服之良

疏○髓者精血之純懿內充以實骨者也鹿稟純陽故其髓味甘氣溫性能補血而潤燥所以主一切血脉不和如傷中脉絕筋急痛及欬逆也日華子同蜜煑服壯陽道令人有子同地黄汁煎膏服塡骨髓壯筋骨治嘔吐者亦此意也

酒服方寸匕日三　子母秘錄産後腹痛瘀
血不盡者鹿角燒研豉汁服方寸匕日三并
治産後血暈　千金方踒跌損傷血瘀骨痛
鹿角末酒服方寸匕　瀕湖方癰疽腫痛毒
鹿角尖磨濃汁塗之

簡誤

無瘀血停畱者不得服陽盛陰虛者忌之胃
火齒痛亦不宜服

生者療中風口僻亦取其有通血脉之功血脉通則口僻自正也

牛角䚡下閉血瘀血疼痛女人帶下燔之味苦無毒

疏〇牛角䚡乃角中嫩骨也爲筋之粹骨之餘入足厥隂少隂血分之藥兼入手陽明經苦能泄濇能通行故主婦人帶下及閉血瘀血疼痛也

○腎平主補腎氣

疏○鹿性淫一牡常御百牝腎氣有餘故也故服之能壯陽道補腎家不足

○鹿肉甘溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之

疏○鹿所食多芳草其性質芳潔氣味醇和故其肉味甘氣溫無毒與他肉不同也性能益脾胃通血脉故主補中強五臟益氣力也

氣大寒無毒經云寒以勝熱苦以泄結故主
心腹熱及渴利口焦燥也肝開竅於目肝熱
則目睛不明入肝泄熱故益目精也近世以
南星末釀入陰乾治驚風有奇功者取其苦
寒製南星之燥俾善於豁痰除熱耳

簡誤

脾胃虛寒者忌之目病非風熱者不宜用

○牛肉味甘平無毒主安中益氣養脾胃

主治參互

同猪懸蹄猬皮金頭蜈蚣蛀竹屑明礬白蠟去漏管　近效方大便下血黃牛角䚡一具煅末煑豉湯服二錢日三　塞上方鼠瘻痔疾牛角䚡燒灰酒服方寸七

○膽味苦大寒無毒除心腹熱渴利口焦燥益目精可丸藥

疏○膽牛食百草其精華萃於膽其味苦其

人熱病合生薑食損齒又云牛乃稼穡之資不可多殺及食若以之療病則藥物甚多以之供饌核則肥甘不少似可無此一物也好生君子其念及而力戒之當有冥福耳

羖羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛久服安心益氣輕身取之時勿中溼溼卽有毒

疏〇牛土畜也黃中央正色也經云中央色黃入通於脾故爲益脾胃之藥脾胃得所養則中自安氣自益矣丹溪朱氏有倒倉法非爲其有吐下之力也特飲之既滿或上湧下泄爾此蓋借其補以爲瀉故積聚去而腸胃得所養亦奇法也但病非關腸胃者不宜服凡牛病死及黑身白頭獨肝者皆不宜服合猪肉及黍米酒食茲生寸白蟲合韭薤食令

產後餘痛亦指血熱氣壅者而言本經又主止寒洩及辟惡鬼虎狼未解其義俟博物者詳之

主治參互

子母秘錄產後寒熱心悶脹極百病羖羊角燒末酒服方寸匕　普濟方治小兒癇疾方同上

○羊腎補腎氣益精髓

疏〇羊角乃肺肝心三經藥也而入肝爲正本經鹹溫別錄苦微寒甄權大寒察其功用應是苦寒居多非苦寒則不能主青盲驚悸殺疥蟲及風頭痛蠱毒吐血也蓋青盲肝熱也驚悸心熱也疥蟲溼熱也風頭痛火熱上升也蠱毒吐血熱毒傷血也苦寒總除諸熱故能療如上等證也驚悸平則心自安熱傷氣熱除則氣自益其主百節中結氣與婦人

疏○羊得火土之氣以生故其味甘氣大熱無毒素問言苦亦以其性熱屬火耳李杲云補可去弱人參羊肉之屬是巳羊肉有形凡形氣瘦弱虛羸不足者宜之其主字乳餘疾者蓋產後大虛血氣暴損得甘熱之物補助陽氣則陰血自長餘疾自除矣中氣虛則心不安或驚惕陽氣弱則頭腦大風汗出補中則中自緩故能安心止驚益氣則陽自足故

疏○羊腎補腎氣者以其類相從借其氣以補其不足也腎得補則精髓自益矣

主治參互

羊腎一對去脂切肉蓯容一兩酒浸一夕去皮膜和作羹加五味食治勞傷陽虛無力

○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

反半夏

菖蒲

同煑下五味作粥食　千金方損傷青腫用
新羊肉貼之
簡誤
羊肉味甘大熱脾胃虚寒羸瘦氣乏者宜之
然天行熱病後溫瘧熱痢後食之必致發熱
難療姙婦食之令子多熱與夫癱腫瘡瘍消
渴吐血嘈雜易饑等證咸不宜服又銅器煑
食之男子損陽女子暴下物性之異如此不

能療頭腦大風汗出及虛勞寒冷也

主治參互

金匱要略羊肉湯治寒勞虛羸及產後心腹疝痛用肥羊肉一斤水一斗煑汁八升入當歸五兩黃耆八兩生薑六兩煑取二升分四服　又方產後虛羸腹痛冷氣不調及腦中風汗自出白羊肉一斤治如常調和食之

飲膳正要壯胃健脾羊肉三斤切粱米二升

肝一具竹刀切和黃連四兩爲丸梧子大食
遠茶淸下七十九日三服忌鐵器猪肉冷水
○羊血主女人中風血虛悶産後血暈悶欲絕
者生飲一升卽活
疏○血爲水化故其味應鹹氣平無毒女人
以血爲主血熱則生風血虛則悶絕鹹平能
補血凉血故主女人血虛中風及産後血悶
欲絕也性能解丹石毒如丹砂水銀汞粉生

可不知也

○羊肝性冷療肝風虛熱目赤暗無所見生食

子肝七枚神効或切薄片水浸傅之

疏○羊肝補肝以類相從肝開竅於目肝熱

則目赤痛失明補肝除熱所以能明目及治

諸目疾也

主治參誤

醫鏡翳膜羞明有淚肝經有熱也用青羊子

精煖盈溢使人生子也女子帶下十二疾皆衝任虛寒所致鹹溫入下焦補煖二脉故亦主之也

主治叅互

同兎絲子覆盆子魚膠車前子巴戟天肉蓯容鹿茸沙苑蒺藜山茱萸能益陽煖精使人有子

簡誤

銀礦砂砒霜硫黃鍾乳礜石陽起石等類凡
覺毒發剌飲一升卽解凡服地黃何首烏諸
補藥者須忌之
牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強
熱大生子除女子帶下十二疾一名狗精六月
上伏取陰乾百日
疏○狗陰莖氣味與馬陰莖同其所主亦相
似性專補右腎命門眞火故能令陽道豐隆

銅治跌撲損傷有神臨杖時服之護心止痛杖後服之生肌長肉　千金方治小兒久痢狗頭骨燒灰白湯服非久痢虛寒者勿用利濟局方狗頭骨丸治久痢臍腹疞痛所下雜色晝夜不止或其人久虛所下腸垢謂之惡痢竝能治之赤石脂乾薑各半兩肉豆蔻煨附子炮去皮各一兩狗頭骨灰一兩為末醋和丸如桐子大每服六七十丸空心米飲

陽事易舉者忌之內熱多火者勿服

○頭骨主金瘡止血燒灰用黃狗者良餘骨燒灰生肌敷馬瘡及瘰諸瘡

瘻妬乳

癰腫

疏○狗頭骨本經無氣味察其功用應是甘鹹溫之物鹹能入血甘能補血溫能和血故

主金瘡止血也

主治參互

同血竭乳香沒藥蚺蛇膽䗪蟲天靈蓋自然

○白狗血味鹹無毒主癲疾發作

疏○癲疾屬手少陰少陰主血藏神血虛而神自不寧故發是證此物入心補血以類相從故主癲疾發作也

簡誤

犬性熱以其稟火土之氣故助陽陽勝則發熱動火生痰發渴凡病人陰虛內熱多痰多火者慎勿食之天行病後尤爲太忌治痢亦

下非陰臟人及陽虛極者不宜用　聖惠方
赤白帶下不止者狗頭骨燒存性爲末每酒
服一錢日三　經驗方產後血不定奔四肢
以狗頭骨灰酒服二錢甚效　衛生易簡方
打損接骨狗頭骨灰熱醋調塗傷處暖臥
壽域方惡瘡不愈狗頭骨灰黃丹等分敷之
同白斂等分爲末生白酒調服五錢治少
腹癰有神

氣血生長腰腎受庇陽道壯健而下焦煖也

主治參互

乾坤秘韞戊戌丸治男子婦人一應諸虛不足大補元氣用黃童子狗一隻去皮毛肚腸同外腎於砂鍋內以酒醅八分水二升入地骨皮一斤肉蓯蓉各半斤同煑一日去藥再煑一夜去骨再煑肉如泥擂細入當歸末四兩蓮肉蒼术末各一斤山藥兎絲子末各十

非所宜
○肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣
疏○犬火畜也其味鹹酸氣溫無毒乃脾胃
家肉也五臟皆賴脾胃以養脾胃得補故主
安五臟五臟安而身自輕氣自益絕傷自補
矣日華子主補胃氣壯陽道暖腰膝益氣力
孟詵主補五勞七傷益陽事補血脉厚腸胃
實下焦塡骨髓者皆取其溫煖脾胃之功則

去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘
寐療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在
骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通久服
強筋骨輕身起陰益氣利丈夫

疏○羊火畜也而羚羊則屬木本經味鹹氣
寒別錄苦微寒無毒氣薄味厚陽中之陰降
也入手太陰少陰足厥陰經少陰爲君主之
官虛則神明不守外邪易侵或蠱毒惡鬼不

兩甘草末八兩和杵千下丸梧子大每空心
酒下六七十丸　危氏方痔漏有蟲用𤏡犬
肉蘸藍汁空心食七日効

簡誤

氣壯多火陰虛之人不宜食凡犬肉不可炙
食令人消渴姙婦食之令子無聲熱病後食
之殺人道家以犬爲地厭忌食

羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰

肝熱則目不明肝藏血熱傷血則惡血注下
肝在志爲怒病則煩滿氣逆噎塞不通苦寒
能凉血熱下降能平逆氣肝氣和而諸證無
不瘳矣

主治參互

同犀角丹砂牛黄琥珀天竺黄金箔茯神遠
志釣藤鈎竹瀝治驚邪魘寐及癲癇狂亂等
疾　同枸杞子甘菊花决明子穀精草生地

祥或邪氣魘寐驚夢狂越僻謬羚羊性靈能
通神靈逐邪氣心得所養而諸證除矣其主
傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨
間者皆厥陰爲病厥陰爲風木之位風熱外
邪傷於是經故見諸證入肝散邪則諸證自
除經曰壯火食氣又曰熱則骨消筋緩火熱
太甚則陰反不能起而筋骨軟鹹寒入下焦
除邪熱則陰自起氣自益筋骨強身自輕也

痕甚明內有天生木胎此角有神力抵千牛
入藥不可單用須要不拆元對繩縛鐵銼銼
細末盡處須重重密褁恐力散也避風擣篩
極細更研萬匝如飛塵後入藥免刮人腸
犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼
瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷
寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健升麻松脂
爲之使惡烏頭忌鹽凡欲作末先鋸
屑置人懷中一宿擣之應手成粉

黃五味子黃蘗蜜蒙花木賊草女貞實治肝腎虛而有熱以致目昏生翳　外臺秘要噎塞不通羚羊角爲細末飲服方寸七　千金方產後煩悶汗出不識人羚羊角燒末東流水服方寸七未愈再服

簡誤

凡肝心二經虛而有熱者宜之虛而無熱者不宜用凡用有神羚羊角甚長有二十四節挂

神靈而寒故能除邪鬼省魘寐其味苦寒能
散邪熱解諸毒故主百毒蠱疰瘴氣殺鉤吻
鴆羽蛇毒及傷寒溫疫頭痛寒熱等證也邪
熱去則心經清明人自不迷惑胃亦遂安而
五臟皆得所養故能令人駿健及久服輕身
也藥性論主鎮心神解大熱散風毒治發背
癰疽瘡腫瘵時疾熱如火煩毒入心狂言妄
語日華子治心煩止驚鎮肝明目海藥主風

疏○犀亦神獸也故其角之精者名通天夜視有光能開水辟邪禽獸見之皆驚駭辟易本經味苦氣寒無毒別錄酸鹹微寒李珣大寒味厚於氣可升可降陽中之陰也入足陽明兼入手少陰經陽明爲水穀之海無物不受又口鼻爲上下陽明之竅邪氣多從口鼻而入凡蠱毒鬼疰與夫風火邪熱氣之侵人也必先入於是經犀角爲陽明經正藥其性

蓋丹砂雄黃能辟鬼疰邪氣　同丹砂琥珀金箔天竺黃牛黃鈎藤鈎羚羊角真珠麝香治大人小兒風熱驚癇　磨汁同生地黃紅花子麥門冬紫草白芍藥鼠黏子治痘瘡血熱初見點紅豔壯熱口渴煩躁狂語多服可保無虞　磨汁同鬱金童便生地黃麥門冬炙甘草白芍藥紫蘇子剪草丹參白藥子治吐血衂血　犀角地黃湯治傷寒畜血發黃

毒攻心 𣭲毿熱悶小兒𪍿豆風熱驚癇子盂詵
主中惡心痛中飲食藥毒心風煩悶中風失
音及今人用治吐血衂血下血傷寒畜血發
狂讝語發黃發斑痘瘡稠密熱極黑陷等證
神效皆取其入胃入心散邪淸熱凉血解毒
之功耳
主治𠫭互
同鬼臼麝香龍齒茯神蘇合香沉水香天靈

生犀角於澀器中新汲水磨濃汁冷飲之
千金方瘭疽毒瘡喜着十指狀如代指根深
至肌能壞筋骨毒氣入藏殺人宜燒鐵烙之
或灸百壯日飲犀角汁瘥　聖惠方下利鮮
血犀角地榆金銀花各一兩升麻五錢爲末
煉蜜丸彈子大每服一丸水一升煎五合去
滓溫服此熱毒伏於心經故也宜加丹砂滑
石末以金銀藤花葉汁煎藥更効

或熱盛吐血　入紫雪丸治大人小兒顛狂
溫疫蠱毒邪魅一切煩熱爲病　入抱龍丸
治小兒恍惚驚悸痰涎壅塞　入至寶丹治
中風不語中惡氣絕一切神魂恍惚癲狂擾
亂等證　聖濟總錄吐血不止似䳺鴨肝用
生犀角桔梗各一兩爲末每酒服二錢　廣
利方治小兒驚癇不知人嚼舌仰目者犀角
磨濃汁服之立効　錢氏小兒方痘瘡稠密

瘻頭骨尤良

疏○虎西方之獸山獸之君屬金而性最有力語云風從虎者風木也虎金也木受金制焉得不從故虎嘯而風生自然之道也所以能治風病攣急屈伸不便走疰骨節風毒驚癇癲疾等證其性雖死而脛猶矻立不仆故脛骨治脚膝無力及手足諸風多効取以類相從借其氣有餘以補不足也本經無氣味

簡誤
瘟瘄氣虛無大熱者不宜用傷寒陰證發躁因陰寒在內逼其浮陽失守之火聚於胸中上衝咽嗌故面赤手溫煩嘔喜飲凉物食下良久復吐出惟脉沉細足冷雖渴而飲水不多且復吐出爲異於陽證耳不宜誤用犀角凉劑姙婦勿多服能消胎氣
虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠

何首烏薏苡仁木瓜刺蒺藜治風寒溼邪着於經絡以致偏痺不仁　同當歸白芍藥炙甘草續斷牛膝白膠麥門冬地黃治遍身骨節痛　永類鈐方健忘驚悸預知散用虎骨酥炙白龍骨遠志等分爲末每服三錢生薑湯下日三久則令人聰慧　李絳兵部手集虎骨治臂脛疼痛不計深淺皆効用虎脛骨二兩酥炙碎羚羊角屑一兩芍藥二兩切以

藥性論云味辛微熱無毒稟勇猛之氣其味
更辛散而通行故主辟邪惡氣殺鬼疰毒止
驚悸也惡瘡鼠瘻亦風邪浸淫所致消散風
邪則惡瘡鼠瘻自除矣

主治參互

同牛膝木瓜地黃山藥山茱萸黃蘗枸杞子
麥門冬五味子治腰脚無力筋骨疼痛或痿
弱不能步履　同萆薢獨活防巳蒼朮牛膝

兎頭骨平無毒主頭眩痛癲疾　腦主塗凍瘡
肝主目暗　肉味辛平無毒主補中益氣
疏○兎屬金得太陰之精故其性喜望月兎
至秋深時可食者金氣全也其肉味辛氣平
無毒然詳其用味應有甘氣應作凉經曰裏
不足者以甘補之又曰熱傷氣味甘而氣凉
所以能補中益氣也肝爲風木之位太過則
摇動撼物兎屬金而頭骨在上尤得氣之全

無灰酒浸之餮至七日秋冬倍之每日空腹
飲一盃若要速服即入磁銀器中以火煖餮
三三日即可服也　聖濟總錄歷節痛風虎
脛骨炙三兩沒藥七錢爲末每服二錢溫酒
下日三　小品方惡犬咬傷虎骨刮末水服
幷傳之
簡誤
凡血不足以餮筋以致筋骨疼痛者宜少用

主治參互

愽濟方催生散用臘月兎腦攤紙上夾匀陰乾剪作符子於面上書生字一箇候產母痛極時用釵股夾定燈上燒灰煎丁香酒調下

和劑局方催生丹麝香乳香母丁香爲末臘月兎腦和丸如芡實大陰乾密封每一丸溫水下卽時產下隨男女左右手中握藥丸是驗　劉氏保壽堂方兎血丸小兒服之終

故能平木邪療頭眩痛癲疾也肝開竅於目
兎目不瞬而瞭然其肝氣足也故能主目暗
河間云兎肝明目因其氣有餘以補不足也
腦爲髓之至精性溫而滑潤故主塗凍瘡皸
裂及世人用爲催生利胎之聖藥也血味鹹
寒能凉血活血解胎中熱毒亦能催生易產
屎一名明月砂明目治目中翳膜勞瘵五疳
痔瘻殺蟲解毒

簡誤

妊娠不宜食兎肉令子缺脣且能致產不順性寒屬陰陽虛無熱者不宜服多服則損元氣痿陽事不宜合白雞獺肉薑橘芥同食八月至十月可食餘月傷人神氣

身不出痘瘡即出亦稀少臘月八日取生兎一隻刺血和蕎麥麪少加丹砂雄黃四五分候乾丸菉豆大初生小兒以乳汁化下二三丸遍身發出紅點是其徵驗也但皃長成常以兎肉啖之尤妙　藺氏經驗方痘後月暨直往山中東西地上不許回顧尋兎屎二七粒以雌雄檳榔各一箇同磨不落地井水調服百無一失其效如神

神農本草經疏卷之十七

7681888
3 1378 00768 1888

OC - 8103